



## Greenmaster® Pro-Lite®

### Spring & Summer

Para un césped fuerte y de mejor color

14 | 5 | 10 | 2.0  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | MgO

## Descripción

El fertilizante Greenmaster Pro-Lite Spring & Summer es ideal para nutrir con precisión durante la mayor parte de la temporada de crecimiento. Proporciona un elevado nivel de nitrógeno (esencial para el desarrollo apical del césped fino) y niveles equilibrados de fósforo y potasio (para obtener un césped de color vivo y para reponer los nutrientes que se pierden con las siegas). Además, aporta magnesio para mejorar la salud y el color del césped.

## Análisis garantizado

### Óxido

N	Nitrógeno Total	<b>14%</b>
	Nitrógeno amoniacal (N-NH <sub>4</sub> )	5.1%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	8.9%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Pentóxido de fósforo	<b>5%</b>
	Soluble en agua (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4.3%

---

K <sub>2</sub> O	Óxido de potasio	<b>10%</b>
	Soluble en agua (K <sub>2</sub> O)	10%

---

MgO	Óxido de magnesio	<b>2%</b>
-----	-------------------	-----------

## Beneficios

- \\ Fertilizante de calidad para los periodos de crecimiento más importantes
- \\ Alta concentración de nitrógeno para un excelente desarrollo apical
- \\ Fósforo y potasio para mejorar la calidad del césped

## Características

<b>Longevidad:</b>	6 semanas
<b>Respuesta del producto:</b>	3-4 días
<b>Respuesta del césped:</b>	7 días

## Dosis recomendadas

Dosis recomendada:

30-35 g/m<sup>2</sup>

---

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.  
Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

## Instrucciones de uso

1


Aplíquelo de abril a julio.

- 2 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no ha llovido.
- 3 El riego ayudará a dispersar el producto y minimizará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en superficies en las que se siega el césped corto.
- 4 Evite su aplicación durante heladas o sequías.
- 5 Riegue bien entre las plantas después de la aplicación para minimizar el riesgo de que se marquen las pisadas.
- 6 Retrase el escarificado vertical y otros arreglos hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen.
- 7 No lo aplique si existe riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, etc.
- 8 Limpie inmediatamente los derrames sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc. con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede causar decoloración.
- 9 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

## Configuración de la abonadora

<b>Tipo de abonadora</b>	<b>Método de aplicación</b>	<b>Ajuste del cono</b>	<b>Ancho de trabajo (m)</b>	<b>Dosis de aplicación (g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Dosis de aplicación (g/m<sup>2</sup>)</b>
				30	35
Abonadora rotativa	1 pasada	6	3,7	M	M
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	6	3,7	J 1/2	K
Abonadora por gravedad	1 pasada	n.a.	0,91	5,25	5,50
SS-2	2 pasadas	n.a.	0,91	4,00	4,50

## Período de uso recomendado



### Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-spring-summer/>  
: 12/05/2024