




Combifert®

Vid

Cultivos sanos, de la viña al vino

20 | 5 | 8 | 2 | 2 | 16 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO SO3

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	20%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	8.8%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	11.2%
P2O5	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P2O5)	3.5%
K2O	Óxido de potasio	8%
	Soluble en agua (K2O)	8%
CaO	Óxido de calcio	2%
	Soluble en agua (CaO)	2%
MgO	Óxido de magnesio	2%
	Soluble en agua (MgO)	2.0%
SO3	Trióxido de azufre	16%
	Soluble en agua (SO3)	16%
Fe	Hierro	1%

Características

Envase:

Saco 25 kg y big
bags de 600 y
1.000 kg

Descripción

El fertilizante Combifert Vid se ha desarrollado específicamente para el cultivo de las vides. Incorpora un elevado contenido de potasio, un nutriente esencial para el crecimiento, la producción y el vigor de la planta. Es fácil de aplicar, y también contiene calcio, magnesio y micronutrientes, todos ellos esenciales para el desarrollo saludable tanto de las vides como de las uvas.

Beneficios

- Alto contenido de potasio para obtener vides fuertes y productivas
- Incluye magnesio para una fotosíntesis eficiente
- Contiene calcio para un desarrollo saludable

Instrucciones de uso

- 1 Aplique el fertilizante especializado Combifert entre filas de 15 a 20 días antes del inicio de la brotación.
- 2 Aplíquelo de modo uniforme en la superficie del suelo, cerca del sistema radicular. Otra posibilidad es aplicarlo de modo localizado, enterrando los gránulos en filas cerca del sistema radicular.
- 3 Si desea recibir más información o recomendaciones, póngase en contacto con el distribuidor o el delegado de ICL de su zona.

Dosis recomendadas

La dosis media de aplicación recomendada es de 300 a 700 kg de fertilizante por hectárea, dependiendo del tipo de cultivo y de la producción prevista.

Haga una pequeño ensayo o prueba a pequeña escala antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.