



Combifert®

14-7-14+2MgO+21SO₃

Azufre en abundancia y magnesio, para que las plantas prosperen

14 | 7 | 14 | 2 | 21
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	14%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	1%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	13%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	7%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Óxido de potasio	14%
	Soluble en agua (K ₂ O)	14%
MgO	Óxido de magnesio	2%
	Soluble en agua (MgO)	2.0%
SO ₃	Trióxido de azufre	21%
	Soluble en agua (SO ₃)	21%

Características

Envase: Saco 25 kg y big
bags de 600 y
1.000 kg

Descripción

El fertilizante Combifert 14-7-14+2MgO+21SO₃ contiene gran cantidad de azufre, que proporciona a las plantas una ayuda esencial para el desarrollo de la clorofila y la síntesis de proteínas. También es rico en magnesio, para mejorar la fotosíntesis, y contiene una buena combinación de NPK para facilitar el desarrollo de sus cultivos en un nivel óptimo de salud. Es perfecto para cultivos hortofrutícolas y extensivos: justo lo que necesitan para un crecimiento vigoroso.

Beneficios

- Composición equilibrada con alto contenido de azufre, más magnesio
- Fácil de aplicar
- Elaborado a medida para proporcionar una nutrición más eficiente

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo de modo uniforme en la superficie del suelo, cerca del sistema radicular.
- 2 Otra posibilidad es aplicarlo de modo localizado, enterrando los gránulos en filas cerca del sistema radicular.
- 3 Guarde el producto en un lugar seco.
- 4 Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
- 5 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

300 a 700 kg de fertilizante por hectárea, dependiendo del tipo de cultivo y de la producción prevista.

Haga una pequeño ensayo o prueba a pequeña escala antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.
