



Sportsmaster[®] CRF

Renovator

Ayude al establecimiento perfecto del césped nuevo

23 | 24 | 5
N P2O5 K2O



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	23%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	0.7%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	6.2%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	16.1%
P2O5	Pentóxido de fósforo	24%
	Soluble en agua (P2O5)	22.6%
K2O	Óxido de potasio	5%
	Soluble en agua (K2O)	5.0%

Características

Envase:	Saco 25 kg
Longevidad:	2-3 meses
	10 días (disperso
	visualmente
Respuesta del producto:	desde la
	superficie)
Respuesta del césped:	7 días

Descripción

Si va a colocar un césped nuevo, sembrar o a resembrar, utilice el fertilizante Sportsmaster CRF Renovator y notará una gran diferencia: el césped se establecerá rápido y formará una superficie densa. Su alto contenido en fósforo garantiza unas raíces fuertes, y la liberación controlada es lo que necesita el césped joven para no quemarse. El fertilizante Sportsmaster CRF Renovator combina la tecnología de liberación controlada con gránulos compuestos: está parcialmente sin encapsular, para una respuesta inmediata.

Beneficios

- Perfecto para césped nuevo, siembra o para resiembra
- Rico en fósforo para fortalecer las raíces y nitrógeno encapsulado para promover un crecimiento uniforme
- La liberación controlada evita que se quemen las plántulas

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco.
- 2 Un buen riego entre las plantas después de la aplicación ayudará a la dispersión de los gránulos, acelerará el efecto inicial y minimizará las marcas de pisadas.
- 3 Recomendamos su aplicación después de programas de aireación como pinchado de los greens, corte o escarificación. No lo aplique durante heladas ni sequías.
- 4 Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., límpielo inmediatamente con un cepillo, ya que puede dejar mancha. Contiene hierro: no lo aplique en caso de riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, piscinas, etc.
- 5 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada: 20 – 30 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.