



Osmocote[®] Pro

3-4M

Para el cultivo profesional

17 | 11 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	17%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	6.6%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	9.0%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	1.4%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	11%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	8.2%
K ₂ O	Óxido de potasio	10%
	Soluble en agua (K ₂ O)	10.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
	Soluble en agua (MgO)	1.3%
B	Boro	0.01%
	Soluble en agua (B)	0.01%
Mn	Manganeso	0.04%
Mo	Molibdeno	0.015%
	Soluble en agua (Mo)	0.010%
Zn	Zinc	0.011%

Descripción

Acelere el crecimiento de sus plantas enmacetadasde ciclo corto con el fertilizante encapsulado Osmocote Pro 3-4M. Su fórmula rica en NPK se ha diseñado para promover un desarrollo integral y un crecimiento rápido de las plantas. La tecnología de encapsulado completo proporciona un suministro constante de nutrientes durante un periodo de longevidad predefinido de 3 a 4 meses, para que pueda despreocuparse en ciclos de cultivo cortos.

Beneficios

- \\ Rico en micronutrientes
- \\ Seguro, fiable y fácil de usar
- \\ Excelente relación calidad-precio

Instrucciones de uso

- 1 Gracias a la tecnología de encapsulado de resina exclusiva de ICL, Osmocote Pro presenta un patrón de liberación muy uniforme.
- 2 Combine Osmocote Pro con un fertilizante soluble.
- 3 Reduzca las dosis recomendadas en función de la cantidad de fertilizante soluble empleada.
- 4 Utilice Osmocote Pro 3-4M para ciclos de cultivo cortos y para enmacetado de plantas de crecimiento rápido de primavera.
- 5 La temperatura puede afectar a la longevidad de Osmocote Pro 3-4M. La longevidad del producto se determina a 21 °C. 16 °C: 4-5M; 21 °C: 3-4M; 26 °C: 2-3M.
- 6 Asegúrese de cerrar bien los sacos empezados o dañados.
- 7 Guarde el producto en un lugar seco.
- 8 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.



Dosis recomendadas

	Necesidades bajas	Necesidades normales	Necesidades altas
Plantas de vivero en contenedor	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Plantas en maceta	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Plantas de temporada / Plantas anuales	1,5-2,5 g/l	2,5-3,5 g/l	3,5-4,5 g/l

Atención Las dosis indicadas se basan en sustratos sin fertilizar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, o ante determinadas condiciones climáticas, se deberán ajustar. Este producto no está aconsejado para aplicación directa en el hoyo de plantación ni para el enmacetado en otoño o invierno. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico. Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra Para el cultivo profesional. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.