



Osmocote[®] Pro

5-6M

Ayude a sus cultivos a prosperar

19 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	19%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	6.4%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	8.2%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	4.4%
P2O5	Pentóxido de fósforo	9%
	Soluble en agua (P2O5)	6.7%
K2O	Óxido de potasio	10%
	Soluble en agua (K2O)	10.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
	Soluble en agua (MgO)	1.3%
B	Boro	0.01%
	Soluble en agua (B)	0.01%
Cu	Cobre	0.037%
	Soluble en agua (Cu)	0.023%
Fe	Hierro	0.30%
	Quelutado por EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Manganeso	0.04%
Mo	Molibdeno	0.015%
	Soluble en agua (Mo)	0.010%
Zn	Zinc	0.011%

Descripción

Controle los enmacetados con el fertilizante encapsulado Osmocote Pro 5-6M. Su fórmula rica en NPK, magnesio y micronutrientes se ha diseñado para ayudar a las plantas a alcanzar un crecimiento completo. El encapsulado de resina proporciona un aporte constante de nutrientes durante un periodo de longevidad de 5-6 meses, lo que le permite despreocuparse durante todo el ciclo de cultivo.

Beneficios

- Altos niveles de micronutrientes
- Se puede combinar con un fertilizante soluble
- Seguro, sencillo y con una buena relación calidad-precio

Instrucciones de uso

- 1 Utilice Osmocote Pro para asegurar un patrón de liberación uniforme y fiable gracias a la tecnología de encapsulado con resina, exclusiva de ICL.
- 2 Combine Osmocote Pro con un fertilizante soluble. Reduzca las dosis recomendadas en función de la cantidad de fertilizante soluble empleada.
- 3 Se recomienda aplicar el producto mezclado en el sustrato. Cuando desee aplicar el producto en el hoyo de plantación, contacte previamente con el técnico de ICL para un asesoramiento personalizado sobre la práctica más correcta.
- 4 La temperatura puede afectar a la longevidad de Osmocote Pro 5-6M. (la longevidad del producto se determina a 21 °C). 16 °C: 6-7M; 21 °C: 5-6M; 26 °C: 4-5M.
- 5 Asegúrese de cerrar bien los sacos empezados o dañados.
- 6 Guarde el producto en un lugar seco.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.



Dosis recomendadas

	Necesidades bajas	Necesidades normales	Necesidades altas
Plantas de vivero en contenedor	2-2,5 g/l	3-3,5 g/l	4-4,5 g/l
Plantas en maceta	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Plantas de temporada / Plantas anuales	2-3 g/l	3-4,5 g/l	4,5-5 g/l

Atención Las dosis indicadas se basan en sustratos sin fertilizar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, o ante determinadas condiciones climáticas, se deberán ajustar. Este producto no está aconsejado para aplicación directa en el hoyo de plantación ni para el enmacetado en otoño o invierno. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico. Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.