



ProTurf®

21-5-6+7CaO+2.5MgO

Aporte nueva vida a su césped

21 | 5 | 6 | 7.0 | 2.5
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	21%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	1.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	19.7%
P2O5	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P2O5)	4.7%
K2O	Óxido de potasio	6%
	Soluble en agua (K2O)	6.0%
CaO	Óxido de calcio	7.0%
	Soluble en agua (CaO)	5.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.5%
	Soluble en agua (MgO)	2.0%

Características

Longevidad:	2 meses
Respuesta del producto:	Medio - Grande
Respuesta del césped:	7 días

Descripción

Revitalice el césped aplicando el fertilizante de liberación controlada ProTurf 21-5-6+7CaO+2,5MgO. Con una combinación de tecnología de liberación controlada y de fertilizantes compuestos, rica en nitrógeno y polihalita aporta todos los macronutrientes necesarios para un césped sano y un efecto prolongado.

Beneficios

- Gránulos finos y uniformemente encapsulados para lograr un impacto mayor
- Crecimiento bajo control con rápido efecto de reverdecimiento
- Gránulos finos muy solubles para minimizar la interferencia con el uso del césped

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo directamente al follaje seco.
- 2 Después de la aplicación, un buen riego entre las plantas facilita la dispersión y potencia un efecto inmediato. No lo aplique durante sequías ni heladas.
- 3 Para reducir el riesgo de que se marquen las pisadas, riegue después de la aplicación. Se debe aplicar tras haber completado programas de aireación, como escarificación, corte o pinchado de los greens, para evitar daños en los gránulos.
- 4 Límpielo inmediatamente si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., ya que este producto puede manchar.
- 5 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 6 Guarde el producto en un lugar seco.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Intervalo de dosis recomendadas:	20,00 - 35,00 g/m ²
Dosis media recomendada:	27,5 g/m ²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.