



Sierrablen[®] Plus

Spring Starter 4-5M

Para un arranque perfecto de la temporada de crecimiento

24 | 5 | 8 | 2.0
N | P2O5 | K2O | MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	24%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	5.4%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	6.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	12.3%
P2O5	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P2O5)	3.7%
K2O	Óxido de potasio	8%
	Soluble en agua (K2O)	8.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%

Descripción

Inicie del modo correcto la temporada de crecimiento con el fertilizante Sierrablen Plus Spring Starter 4-5M. Con la incorporación de las tecnologías de encapsulado patentadas por ICL, podrá aportar al césped una liberación controlada de nutrientes que se prolongará durante los meses de verano debido a su longevidad predeterminada de 4-5 meses. Además de un crecimiento sano, completo y equilibrado, conseguirá un césped verde y denso gracias al aporte extra de magnesio.

Características

Longevidad:	3 meses 7 días (disperso visualmente desde la superficie)
Respuesta del producto:	7 días
Respuesta del césped:	

Beneficios

- \\ Perfecto como primer fertilizante de liberación controlada de la temporada
- \\ Alto nivel de nitrógeno para una respuesta rápida, incluso a bajas temperaturas
- \\ Garantiza un crecimiento sano y completo desde el inicio de la temporada

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo directamente al follaje seco.
- 2 Un buen riego entre las plantas después de la aplicación de este producto facilita la dispersión y potencia un efecto inmediato. No lo aplique durante sequías ni heladas.
- 3 Se debe aplicar tras haber completado programas de aireación, como escarificación, corte o pinchado de los greens, para evitar daños en los gránulos.
- 4 Si se vierte sobre hormigón, pavimento, ropa, etc., límpielo inmediatamente con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede manchar.
- 5 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 6 Guarde el producto en un lugar seco.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dosis recomendadas

Dosis media recomendada:

30-45 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.