



# Sportsmaster®

## Preseeder

Ayude a su nuevo césped a empezar mejor su vida

8 | 12 | 8 | 3.0  
N P2O5 K2O MgO



## Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	8%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	8.0%
P2O5	Pentóxido de fósforo	12%
	Soluble en agua (P2O5)	10.2%
K2O	Óxido de potasio	8%
	Soluble en agua (K2O)	8.0%
MgO	Óxido de magnesio	3.0%

## Características

Longevidad:	6 semanas
Dispersión del producto:	4-5 días
Respuesta del césped:	7 días

## Descripción

Facilite la germinación y establecimiento de sus semillas aplicando el fertilizante Sportsmaster Preseeder de fondo. También es una opción magnífica para aplicar antes de colocar nuevo césped con tepes. Su formulación incluye nitrógeno, potasio y abundante fósforo para facilitar el establecimiento de las semillas. Además, contiene magnesio para conseguir un color vivo y eliminar los indicios de estrés. Dura hasta 6 semanas. Se presenta en forma de microgránulos fáciles de esparcir uniformemente a dosis bajas, que se descomponen rápido, por lo que la respuesta se notará en poco tiempo. Perfecto para céspedes deportivos o áreas verdes. Utilice Sportsmaster Preseeder entre primavera y otoño.

## Beneficios

- Perfecto para aportar antes de la resiembra o de la colocación de césped nuevo
- Potencia el establecimiento y el color
- Microgránulos eficaces y fáciles de usar

## Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no llueve.
- 2 Es conveniente regar para ayudar a dispersar el producto, mejorar la respuesta inicial y reducir el riesgo de marcas por pisoteo así de que se lo lleve un cortacésped al fertilizar superficies en las que se siega el césped corto.
- 3 No lo aplique en condiciones de sequía ni de helada.
- 4 Para que los gránulos puedan dispersarse adecuadamente, no realice escarificado vertical ni otras prácticas culturales hasta que hayan transcurrido 3 días a partir de la aplicación.
- 5 Límpielo inmediatamente si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., ya que este producto puede manchar.
- 6 Cierre bien los sacos empezados o dañados. Guarde el producto en un lugar seco.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

## Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

## Dosis recomendadas

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

## Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.