



Sierraform[®] GT

CalMag

Para suelos pobres en calcio y magnesio

14 | 0 | 7 | 8 | 5 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	14%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	1.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	2.9%
	Ureaformaldehído (N-MU)	9.8%
P2O5	Pentóxido de fósforo	0%
K2O	Óxido de potasio	7%
	Soluble en agua (K2O)	7%
CaO	Óxido de calcio	8%
	Soluble en agua (CaO)	8%
MgO	Óxido de magnesio	5%
	Soluble en agua (MgO)	5.0%
Cu	Cobre	0.02%
Fe	Hierro	0.5%
Mn	Manganeso	0.100%
Mo	Molibdeno	0.001%
Zn	Zinc	0.02%

Características

Longevidad:	6-8 semanas
Dispersión de los gránulos:	1-3 días
Respuesta del césped:	4-7 días
Envase:	20 kg
Cobertura por saco (20 kg):	665-1330 m ²

Descripción

Es justo lo que su césped le pide. Es perfecto para suelos con necesidad de calcio y magnesio. Además de estos, también contiene micronutrientes, SMX para mejorar la tolerancia al estrés y fortalecer las raíces, y libera de manera constante nitrógeno a base de MU para promover un crecimiento homogéneo. Con estos minigránulos compuestos, conseguirá una cobertura uniforme sin necesidad de consumir grandes cantidades. No contiene fosfatos, por lo que no acumula fósforo. Es ideal para usar durante el verano en todo tipo de céspedes finos. Tendrá un césped más sano en general, con liberación de nutrientes durante 8 a 10 semanas.

Beneficios

- Aporte extra de calcio y magnesio, más micronutrientes
- Fórmula a base de MU: liberación lenta de nitrógeno
- Raíces más fuertes, césped más sano, crecimiento constante

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después, si no ha llovido.
- 2 El riego ayudará a dispersar el producto y reducirá el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en las superficies de césped muy corto.
- 3 El riego entre las plantas después de la aplicación minimizará la aparición de marcas de pisadas. Evite las aplicaciones en condiciones de heladas o sequía.
- 4 Retrase el escarificado vertical y otros arreglos hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen adecuadamente. Cuando las temperaturas del suelo son inferiores a 10 °C, se libera mucho menos nitrógeno.
- 5 Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., límpielo inmediatamente con un cepillo, ya que puede dejar mancha. Contiene hierro: no lo aplique en caso de riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, piscinas, etc.
- 6 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:

15 – 30 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.