



Osmocote[®] Topdress

5-6M

Nutra sus plantas de vivero

23 | 5 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	23%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	6.4%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	7.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	9.3%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Óxido de potasio	10%
	Soluble en agua (K ₂ O)	10.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
Fe	Hierro	0.50%

Descripción

Para abonar en cobertera las plantas de vivero en contenedor, recomendamos el fertilizante encapsulado Osmocote Topdress 5-6M. Con las nuevas tecnologías de ICL incorporadas, se satisfacen los requisitos nutritivos exactos de las plantas y se limita la lixiviación de nutrientes. Proporcione a sus plantas los beneficios de una liberación lenta y constante de fósforo y nitrógeno.

Beneficios

- \\ Contiene fósforo y nitrógeno de liberación rápida y lenta
- \\ Efecto de reverdecimiento inmediato gracias a sus altos niveles de magnesio, nitrógeno y hierro
- \\ Sin polvo

Instrucciones de uso

For more information, contact your ICL Specialty Fertilizers advisor.

- 1 Utilice el fertilizante encapsulado Osmocote Topdress desarrollado especialmente para aplicaciones en cobertera en plantas de vivero en contenedor.
- 2 Aplique este producto en cobertera en sus plantas en contenedor para lograr un efecto de reverdecimiento rápido o corregir imperfecciones.
- 3 Puede abonar en cobertera junto al riego por goteo o por aspersión.
- 4 Si emplea riego por goteo, aplique el producto directamente bajo los goteros. Puede aplicar el producto mediante los aplicadores para cobertera recomendados por ICL. Riegue bien después de la aplicación.
- 5 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 6 Guarde el producto en un lugar seco.

Dosis recomendadas

	Contenedores < 10 litros	Contenedores > 10 litros
Plantas de vivero en contenedor	2-4 g/l	1 g/l por cada litro adicional*

*Ejemplo: Dosis total si se usa un contenedor de 50 litros: 3 g/l para los primeros 10 litros = 30 gramos 1 g/l para los 40 litros adicionales = 40 gramos Total = 30 + 40 = 70 gramos por contenedor de 50 litros Atención Para las plantas sensibles, reduzca estas dosis recomendadas. Aplique el producto únicamente en cobertera. Si emplea riego por goteo, coloque el producto bajo los goteros. Riegue bien después de la aplicación. Este producto no está indicado para mezclas ni para aplicación directa en el hoyo de plantación en sustratos. Los productos Topdress no se pueden usar con sistemas de riego por capilaridad con esteras ni de riego por inundación y drenaje. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico. Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable o práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.