

Greenmaster® Pro-Lite®

Invigorator Plus

Consiga un césped más fuerte

Análisis garantizado

Óxido)	
N	Nitrógeno Total	4%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	4.0%
P205	Pentóxido de fósforo	3.0%
	Soluble en agua (P2O5)	0.5%
K20	Óxido de potasio	14%
	Soluble en agua (K2O)	14.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
Fe	Hierro	8.00%

Características

Envase: 25 kg
Cobertura por envase (25 kg): 714 - 833 m²
Longevidad: 6 semanas
Respuesta del producto: 3-4 días
Respuesta del césped: 7 días

Descripción

¿Tiene problemas para fortalecer su césped? El fertilizante granulado Greenmaster Pro-Lite Invigorator Plus es una nueva fórmula fortalecedora del césped, con mayor contenido de hierro y potasio para presumir de color y césped sano desde el inicio del otoño hasta el final de la primavera.

Beneficios

La mejor respuesta en color

Ayuda a mantener el césped sano de otoño a primavera

Nura hasta 6 semanas



Instrucciones de uso

- Aplíquelo de septiembre a mayo.
- Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no llueve.
- 3 El riego ayudará a dispersar el producto y minimizará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en superficies en las que se corta el césped corto.
- 4 Evite su aplicación durante heladas o sequías.
- Riegue bien entre las plantas después de la aplicación para minimizar el riesgo de que se marquen las pisadas.
- Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen.
- Contiene hierro: No lo aplique si existe riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, etc.
- Limpie inmediatamente los derrames sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc. con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede manchar. Cierre bien los sacos empezados o dañados. Guarde el producto en un lugar seco.
- 9 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:

 $30-35 \text{ g/m}^2$

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

