



**Agroleaf[®]
Liquid**

B-10

Una inyección de boro para mejorar la calidad de los cultivos

0 | 0 | 0
N P₂O₅ K₂O



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	0%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	0%
K ₂ O	Óxido de potasio	0%
B	Boro	10.00%
	Soluble en agua (B)	10.00%

Características

Envase:	5 litros
pH:	7
Densidad (g/cc) a 20°C:	1,33 ±0.01

Descripción

Agroleaf Liquid B-10 es un fertilizante líquido con un 10 % de boro. Previene o corrige deficiencias o desequilibrios en la asimilación de este micronutriente. Puede aplicarlo por vía foliar o radicular, a cultivos leñosos y herbáceos. La deficiencia de boro en los cultivos agrícolas es la más extendida en todo el mundo y provoca importantes pérdidas de producción y calidad. Si las plantas no reciben suficiente boro, no pueden alcanzar el grado de desarrollo vegetativo y reproductivo necesario, lo que inhibe la expansión celular, acaba con los meristemas y reduce la fertilidad. Pero esto no tiene por qué pasarle a usted: utilice Agroleaf Liquid B-10 y sus cultivos tendrán todo el boro que necesitan.

Beneficios

- \\ Evita la deficiencia de boro
- \\ Apto para cultivos leñosos y herbáceos
- \\ Aplicación por vía foliar o radicular

Instrucciones de uso

- 1 Para los cultivos especialmente sensibles a las deficiencias de boro, se recomienda una aplicación preventiva por vía radicular o foliar, dividiendo la dosis indicada en 2 o 3 fracciones.
- 2 En los cultivos leñosos, aconsejamos aplicar tratamientos preventivos después de la floración y la aparición de los frutos, coincidiendo con la detección de un aumento de brotes de enfermedades, y en los cultivos extensivos, durante las fases iniciales de mayor desarrollo vegetal.
- 3 En caso de observarse una deficiencia, realice 2 o 3 aplicaciones consecutivas de Agroleaf Liquid B-10 por vía foliar a intervalos de 15-20 días y, si es necesario, continúe aplicando dosis a través de las raíces.
- 4 Guarde el producto en un lugar seco.
- 5 Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
- 6 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

Crops:	Method:
Olivo:	Aplíquelo 30 días antes de la floración y durante la fase de endurecimiento del hueso, en dosis de 150-350 cm ³ /hl, con un consumo total de 800-1000 l/ha.
Cítricos y frutales:	Aplíquelo antes de la floración, la caída de pétalos y el desarrollo de los frutos, en dosis de 150-300 cm ³ /hl.
Hortalizas:	Aplique 150-300 cm ³ /hl 15 días antes del inicio de la floración.

Haga un pequeño ensayo o prueba a pequeña escala antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.