Sport High N

Haute teneur en azote pour une croissance soutenue

16 | 3 | 6 | 2 | OE

N P2O5 K2O MgO

Analyse garantie

Oxyde		
N	Azote total (N)	16%
	Azote ammoniacal (NH4-N)	3%
	Azote uréique (Ur-N)	11.5%
	Azote organique	1.5%
P2O5	Pentoxyde de Phosphore	3%
K2O	Oxyde de Potasse	6%
	Soluble dans l'eau (K2O)	6%
MgO	Oxyde de Magnésium	2%
Fe	Fer	0.5%

Caractéristiques

Conditionnement :	Sac de 25 kg
Granulométrie :	2 – 4 mm

Description

Gronamic Sport High N , grâce à sa combinaison d'éléments organiques et minéraux, assure une nutrition lente, durable et parfaitement assimilable.
Il est spécialement conçu pour être utilisé à toutes les périodes de croissance du gazon.
L'apport en macronutriments et en fer assure une excellente santé du gazon, par une couleur optimale et une résistance accrue.
Gronamic Sport High N contient également de la Polyhalite utilisable en agriculture biologique (haute teneur en éléments naturels : Potassium, Magnésium, Calcium 100 % soluble), pour un gazon plus vert même en période de stress.

Recommandations d'utilisation

1. Appliquer l'engrais sur un terrain sec de Mars à Septembre. Arroser si aucune pluie ne survient 1 ou 2 jours après l'application
2. La pluie ou l'arrosage facilitent la dispersion de l'engrais et réduisent le risque de perte d'engrais lors de la tonte de surfaces proches.
3. Ne pas appliquer en période de gel ou de sécheresse. Attendre deux jours avant de tondre pour permettre la dispersion de l'engrais
4. Ce produit contient du fer. En cas de contact avec des matériaux, balayer ou souffler immédiatement pour éviter tout risque de tache ou de décoloration
5. Période d'utilisation : de Mars à Septembre
6. Bien refermer les sacs utilisés ou abîmés
7. Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé
8. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le produit ou du réglage des épandeurs, veuillez contacter votre distributeur ou votre conseiller ICL

Période d'utilisation recommandée

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
		■	■	■	■	■	■	■			

Doses d'applications

Dose d'application :	Surface couverte par 1 sac :	Dispersion des granules :	Réponse du gazon :
25-40 g/m²	625 – 1000 m²	2 – 4 jours	3 – 7 jours

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.