



Agromaster®

10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃

Kontrolirana opskrba dušikom, čak i pod najtežim vremenskim uvjetima i uvjetima tla

10 · 5 · 23 · 2.0 · 5.0 · 29.0
N P₂O₅ K₂O CaO MgO SO₃



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	10%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	1.6%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	2.3%
	Urea dušik (N-urea)	6.1%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	5%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Kalijev oksid	23%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	23.0%
CaO	Kalcijev oksid	2.0%
	Topljiv u vodi (CaO)	2.0%
MgO	Magnezijev oksid	5.0%
SO ₃	Sumporov trioksid	29.0%

Opis

Zadovoljite sve potrebe svog krumpira, voća i povrća za kalijem uz Agromaster 10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃ | 2-3M. To NPK gnojivo s visokim udjelom kalija i dodatkom sumpora, magnezija i kalcija, sa 61% obloženog dušika, savršeno je za vaše usjeve srednje dugog ciklusa uzgoja na laganom tlu. Zahvaljujući ICL-ovoj patentiranoj tehnologiji E-Max Release, možete biti sigurni da će vaše biljke uživati u kontroliranoj opskrbi dušikom 2 – 3 mjeseca, čak i u najtežim vremenskim uvjetima i uvjetima tla.

Prednosti

- Poboljšana učinkovitost upotrebe dušika u odnosu na konvencionalna gnojiva
- Visok sadržaj kalija za veće prinose
- Dodatni kalcij – za poboljšanje transporta i skladištenja konačnih proizvoda
- Visoka razina magnezija – za povećanje fotosintetske aktivnosti
- Visoka razina sumpora – za poboljšanje unosa dušika
- Smanjen gubitak dušika kroz ispiranje, isparavanje i denitrifikaciju

Kako upotrebljavati

- 1 Primijenite razbacivanjem, redanjem ili po gredicama.
- 2 Unesite u tlo na dubinu između 5 i 10 cm.
- 3 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 4 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 5 Smanjite dozu ako se WSF-ovi upotrebljavaju u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 6 Čuvajte na suhom.
- 7 Pravilno zatvorite djelomično iskorištene ili oštećene vrećice.
- 8 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Usjevi	Stope
Krumpir za preradu i konzumaciju	400-800 kg/ha
Povrće, uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenim poljima	
Rajčica, paprika i patlidžan	400-800 kg/ha
Krastavac, kornišon, tikvica, dinja i lubenica	400-800 kg/ha
Luk i češnjak	400-800 kg/ha
Mrkva i drugo korjenasto povrće	400-800 kg/ha
Salata iceberg	400-800 kg/ha
Meko voće uzgojeno u tlu	
Jagode	400-800 kg/ha

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj

