



Agroleaf[®] Liquid

Moly B

Vrhunsko tekuće gnojivo s borom i molibdenom

4 | 16 | 4
N P2O5 K2O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	4%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	2.6%
	Urea dušik (N-urea)	1.4%
P2O5	Fosforov pentoksid	16%
	Topljiv u vodi (P2O5)	16%
K2O	Kalijev oksid	4%
	Topljiv u vodi (K2O)	4%
B	Bor	0.1%
	Topljiv u vodi (B)	0.1%
Mo	Molibden	2.00%
	Topljiv u vodi (Mo)	2.00%

Opis

Agroleaf[®] Liquid Moly B je visokokvalitetno tekuće folijarno gnojivo s NPK, obogaćeno borom i visokom koncentracijom molibdena. Razvijen je za usjeve s velikom potražnjom za borom i molibdenom, nudeći brzo rješenje za ispravljanje bilo kakvih nedostataka u njima. Tajna Agroleaf[®] Liquid Moly B je u F3 SurfActive tehnologiji, razvijenoj u tvrtki ICL kako bi svaka folijarna primjena bila učinkovitija. Vaši usjevi imaju koristi od poboljšanog rasprostiranja, prijanjanja i zadržavanja. Smanjuje površinsku napetost kapljica, pa se hranjive tvari ravnomjernije raspoređuju po lišću, osiguravajući veću pokrivenost i bolju apsorpciju hranjivih tvari. Tehnologija se zasniva na zadržavanju više hranjivih tvari, sprječavanju njihovog slijevanja ili odbijanja od lišća. F3 također pomaže hranjivim tvarima da stvore male naslage na površini lista, koje se ponovno aktiviraju nakon ponovnog vlaženja kako bi se spriječilo isparavanje. Hranjive tvari tada ostaju dulje, poboljšavajući folijarnu primjenu.

Prednosti

- \\ Suzbija nedostatak bora i molibdena u pupoljku ili ga ispravlja
- \\ Prikladno za širok raspon usjeva
- \\ Bolje razmazivanje, prijanjanje i zadržavanje

Kako upotrebljavati

1

Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporuka za usjeve	Doziranje litra/ha	Volumen vode litra/ha	Koncentracija (%)	Vrijeme
Plodovito povrće, krumpir	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, Za usjeve uzgojene na otvorenom, nakon zatvaranja reda
Mahunarke (soja)	1-2	300	0.3-0.7	Na 6 listova
Kupus, cvjetača, brokula	1-3	300-600	0.3-0.5	Na 6-8 listova, 2-3 puta
Uljana repica	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	U jesen, proljeće do cvatnje, 2 puta
Suncokret	1-3	200-300	0.5-1	Na 4-6 listova
Šećerna repa	1-3	250-400	0.4-0.8	Na 6-8 listova
Pašnjak	0.5-1	200-300	0.25-0.3	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 2-3 puta

Koristite manje doze u nižim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Pratite rezultate testa u manjoj mjeri prije promjene bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj