



Agroleaf[®] Liquid

Iron

Izjednačite nedostatak željeza u svojim usjevima

O | O | O | TE
N P2O5 K2O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	0%
P2O5	Fosforov pentoksid	0%
K2O	Kalijev oksid	0%
Fe	Željezo	4.400%
	Topljiv u vodi (Fe)	4.400%
	Željezo EDTA (Fe)	4.400%

Opis

Agroleaf[®] Liquid Iron vrhunska je folijarna ishrana u tekućem obliku koja sprečava nedostatak željeza. Formuliran je za upotrebu u usjevima svih vrsta, posebno mekog voća.

Agroleaf[®] Liquid Iron ima ICL-ovu nenadmašnu F3 SurfActive tehnologiju, koju smo osmislili posebno da svaku folijarnu primjenu učini učinkovitijom. To čini na tri načina: poboljšanjem rasprostiranja, prijanjanja i zadržavanja. Tehnologija F3 smanjuje površinsku napetost kapljica, omogućujući ravnomjerniju raspodjelu hranjivih tvari po lišću za veću pokrivenost i bolji unos hranjivih tvari. Također zadržava više hranjivih tvari na površini lista. F3 pomaže hranjivim tvarima u stvaranju malih naslaga na površini lista, koje se ponovno aktiviraju nakon ponovnog vlaženja. To sprječava isparavanje, što znači da se hranjive tvari dulje zadržavaju, poboljšavajući folijarnu primjenu.

Prednosti

- \\ Hrani vaše biljke željezom koje im je potrebno
- \\ Izvrstan za širok raspon usjeva, posebno za meko voće
- \\ Bolje rasprostiranje, prijanjanje i zadržavanje

Kako upotrebljavati

1

Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporuka za usjeve	Doziranje litra/ha	Volumen vode litra/ha	Konc (%)	Vrijeme
Plodovito povrće	3-6	300-600	1	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta
Jagoda	3-6	250-400	1.2-1.5	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta
Borovnica	3-6	250-400	1.2-1.5	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta
Ostalo meko voće	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta za primjenu kod oporavka
Voćnjaci	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta za primjenu kod oporavka
Vinogradi	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta za primjenu kod oporavka
Ukrasno bilje	2-3	600-1000	0.3	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 3-4 puta

Koristite manje doze u manjim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj