



Agromaster®

12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃

Idealno za usjeve s visokim potrebama za kalijem

12 | 12 | 22 | 3.7 | 2 | 13.5
N P₂O₅ K₂O CaO MgO SO₃



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	12%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	4.5%
	Urea dušik (N-urea)	7.5%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	12%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Kalijev oksid	22%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	22%
CaO	Kalcijev oksid	3.7%
	Topljiv u vodi (CaO)	3.7%
MgO	Magnezijev oksid	2%
	Topljiv u vodi (MgO)	2.0%
SO ₃	Sumporov trioksid	13.5%
	Topljiv u vodi (SO ₃)	13.5%

Opis

Pomozite svojim usjevima krumpira, povrća i voća uzgojenim u tlu u najtežim uvjetima uz Agromaster® 12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃ | 2-3M. Sa svojim klasičnim omjerom NPK 2-2-4, zajedno s dodanim kalcijem, magnezijem i sumporom, to je vaše idealno rješenje za zadovoljavanje visokih potreba vaših usjeva za kalijem na otvorenom polju ili zaštićenom području. Zajamčite svojim biljkama kontrolirano, pouzdano i neprekidno oslobađanje dušika 2 – 3 mjeseca, čak i u najtežim okruženjima i uvjetima, zahvaljujući ICL-ovoj vrhunskoj tehnologiji E-Max Release.

Prednosti

- \\ Idealan omjer NPK za veće prinose
- \\ Dodan kalcij za poboljšani transport i pohranu konačnog proizvoda
- \\ Uključuje dodani magnezij za poboljšanu fotosintezu

Kako upotrebljavati

- 1 Primijenite razbacivanjem, redanjem ili po gredicama.
- 2 Ugradite u tlo na dubinu između 5 i 10 cm.
- 3 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 4 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 5 Smanjite dozu ako se vodotopiva gnojiva upotrebljavaju u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 6 Čuvajte na suhom.
- 7 Pravilno zatvorite djelomično iskorištene ili oštećene vrećice.
- 8 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Usjevi	Stope
Krumpir za preradu i konzumaciju	400-800 kg/ha
Povrće, uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenim poljima	
Rajčica, paprika i patlidžan	400-800 kg/ha
Krastavac, tikvica, dinja i lubenica	400-800 kg/ha
Luk i češnjak	400-800 kg/ha
Mrkva i drugo korjenasto povrće	400-800 kg/ha
Salata iceberg	400-800 kg/ha
Meko voće uzgojeno u tlu	
Jagode	400-800 kg/ha

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj