



Agroblen®

8-28-7+3CaO+3MgO+8.5SO₃+0.5B

Dugotrajno rješenje za dugotrajne usjeve

8 · 28 · 7 · 3.0 · 8.5
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	8%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	2.1%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	5.9%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	28%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	21.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	7%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	7.0%
MgO	Magnezijev oksid	3.0%
SO ₃	Sumporov trioksid	8.5%
B	Bor	0.50%
	Topljiv u vodi (B)	0.43%

Opis

Kada vaše šume, vinogradi i plantaže mekog voća trebaju visokokvalitetni fosfor, posegnite za Agroblen® 8-28-7+3CaO+3MgO+8.5SO₃+0.5B | 5-6M. Sadrži dodani kalcij, magnezij i sumpor, zajedno s visokim razinama bora, ova NPK formula s visokim udjelom fosfora vaše je savršeno rješenje za prehranu dugoročnih usjeva. Priuštite svojim biljkama kontrolirano, kontinuirano i pouzdano otpuštanje hranjivih tvari za 5-6 mjeseci zahvaljujući ICL-ovim patentiranim Resin i E-Max Release Technologies.

Prednosti

- ▀ Potpuno obložen NPK za optimalnu primjenu u rupama za sadnju biljaka
- ▀ Visok sadržaj fosfora za nove nasade
- ▀ Visoka razina bora za smanjenu deformaciju stabla i poboljšani razvoj drva
- ▀ Dodatne sekundarne hranjive tvari za poboljšanje snage biljaka, povećanje fotosinteze i unosa dušika

Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti sadeći u jame.
- 2 Također možete primjeniti kod sadnje u nizu, lokalizirano ili kod sadnje rasipačima.
- 3 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 4 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 5 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 6 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 7 Smanjite primjenjenu dozu ako se vodotopiva gnojiva koriste u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 8 Čuvati na suhom
- 9 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 10 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



Stope primjene

Usjevi:

Stopa

Šumarstvo: eukaliptus (nove plantaže)	50-75 g/biljci
---------------------------------------	----------------

Ostale pogodne kulture: Vinogradi i jagodičasto voće (kupina, malina, ribizl) - novi nasadi	10-20 g/biljci
---	----------------

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj

