



Agroblen®

17-7-10+4MgO

Tropske kulture trebaju bogata gnojiva

17 | 7 | 10 | 4.0
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Zajamčena analiza

oxide		
N	Ukupni dušik	17%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	7.8%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	9.2%
	Urea dušik (N-urea)	0%
	Organski dušik	0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	7%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	5.2%
K ₂ O	Kalijev oksid	10%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	10.0%
MgO	Magnezijev oksid	4.0%
	Topljiv u vodi (MgO)	0%

Opis

Pritisnite gumb nitro boost na svojim plantažama citrusa i palminog ulja s Agroblen® 17-7-10+4MgO | 12-14M. Ovo NPK gnojivo s visokim sadržajem dušika obogaćeno je magnezijem koji pospješuje fotosintezu, što ga čini vašim idealnim rješenjem za uspostavljanje novih suptropskih poljskih ili glavnih rasadnika. Zahvaljujući ICL-ovoj patentiranoj tehnologiji otpuštanja, ovaj posebno dizajnirani, visokokvalitetni paket hranjivih tvari oslobađa se tijekom ogromnog razdoblja od 12-14 mjeseci na kontroliran, pouzdan i ekološki prihvatljiv način.

Prednosti

- \\ Savršen omjer NPK za ravnomjeran, dugotrajan vegetativni rast
- \\ Dodan magnezij za pojačanu fotosintetsku aktivnost
- \\ Ekološki prihvatljive obložene NPK granule

Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti metodom jame za sadnju.
- 2 Također možete primijeniti kod sadnje u nizu, lokalizirano ili kod sadnje rasipačima.
- 3 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 4 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 5 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 6 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 7 Čuvati na suhom
- 8 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 9 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



Stope primjene

Usjevi:	Stopa
Citrusi (novi nasadi, s mladim biljkama iz vreće od 4-6 litara) Način primjene: zatrpavanje (pomiješano sa zemljom oko korijena)	200-300 g/biljci
Palma uljarica: Stadij prije rasadnika (podijeljen u dvije rupe pored sjemena):	4 g/biljci
Palma uljarica: Glavni rasadnik:	50 g/biljci
Palma uljarica: Sadnja prve godine:	300 g/biljci

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj