



# Agroblen®

18-5-11+2MgO

Dajte svojim usjevima najbolje

18 | 5 | 11 | 2.0  
N P2O5 K2O MgO



## Zajamčena analiza

| Oksid |                                       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|
| N     | Ukupni dušik                          | 18%   |
|       | Nitratni dušik (N-NO <sub>3</sub> )   | 7.5%  |
|       | Amonijačni dušik (N-NH <sub>4</sub> ) | 8.4%  |
|       | Urea dušik (N-urea)                   | 2.1%  |
| P2O5  | Fosforov pentoksid                    | 5%    |
|       | Topljiv u vodi (P2O5)                 | 3.7%  |
| K2O   | Kalijev oksid                         | 11%   |
|       | Topljiv u vodi (K2O)                  | 11.0% |
| MgO   | Magnezijev oksid                      | 2.0%  |

## Opis

Uberite plodove svog rada s Agroblen® 18-5-11+2MgO | 3-4M, gnojivo s kontroliranim otpuštanjem posebno dizajnirano za prehrambene potrebe vaših usjeva jagoda i mekog voća. NPK formula ovog proizvoda s visokim udjelom dušika u potpunosti obložena s dodatkom magnezija osigurava brz rast i učinkovito uspostavljanje usjeva, čak i u širim usjevima voća i povrća. Nakon samo jedne jednostavne primjene u redove, možete se opustiti i uživati u 3-4 mjeseca kontrolirane ishrane za svoje biljke zahvaljujući ICL-ovoj patentiranoj tehnologiji oslobađanja.

## Prednosti

- Visok sadržaj dušika za ravnomjeran rast
- Smanjeno ispiranje hranjivih tvari tijekom navodnjavanja ili kiše
- Dizajniran posebno za proizvodnju jagoda u "frigo" sadnicama

## Kako upotrebljavati

- 1 Primjenite kod sadnje u nizu ili kod sadnje rasipačima.
- 2 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 3 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 4 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 5 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 6 Smanjite primijenjenu dozu ako se vodotopiva gnojiva koriste u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 7 Čuvati na suhom.
- 8 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 9 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



## Stope primjene

| Usjevi:                                | Stopa                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jagode:                                | 12-15 g/biljci za usjeve uzgojene na otvorenom tlu (kod 30.000 pl/ha)             |
| Jagode:                                | 3-4 g/biljci za usjeve uzgojene na otvorenom tlu, u gredicama (pri 100.000 pl/ha) |
| Ostalo meko voće:                      | 300-450 kg/ha, primjena u redove                                                  |
| Ostali prikladni usjevi: 300-600 kg/ha |                                                                                   |

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

## Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj