



# Agromaster®

40-0-5

Bezuvjetan rast u neuobičajenim uvjetima

40 | 0 | 5  
N    P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>    K<sub>2</sub>O



## Zajamčena analiza

| Oksid                         |                                       |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| N                             | Ukupni dušik                          | 40%   |
|                               | Amonijačni dušik (N-NH <sub>4</sub> ) | 1.6%  |
|                               | Urea dušik (N-urea)                   | 38.4% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Fosforov pentoksid                    | 0%    |
| K <sub>2</sub> O              | Kalijev oksid                         | 5%    |
|                               | Topljiv u vodi (K <sub>2</sub> O)     | 5%    |

## Opis

Očvrsnite svoje obradive usjeve i usjeve povrća na otvorenom polju čak i u najtežim uvjetima uz Agromaster® 40-0-5 | 1-2M, koji sadrži dušik, kalij i 4,5 % SO<sub>3</sub>. Sa svojom kombinacijom ICL-ove patentirane tehnologije E-Max Release i posebno odabranih granula, možete osigurati kontrolirani i dosljedni rast biljaka bez obzira na uvjete. Suočite se s nepovoljnim vremenskim uvjetima ili uvjetima tla i držite opskrbu hranjivim tvarima pod potpunom kontrolom s najtežim usjevima, čak i pod onim jakim proljetnim pljuskovima.

## Prednosti

- Visok sadržaj dušika za kontrolirani biljni rast
- Povećava ili održava prinos usjeva, čak i pri nižim stopama primjene hranjivih tvari
- Uključuje sumpor za poboljšane proteine i peptide

## Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti po redovima ili razbacivanjem.
- 2 Unesite u tlo na dubinu između 5 i 10 cm.
- 3 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 4 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 5 Čuvajte na suhom.
- 6 Pravilno zatvorite djelomično iskorištene ili oštećene vrećice.
- 7 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

## Stope primjene

---

Opća količina primjene: 150 – 300 kg/ha

---

Za upotrebu na: Obradivim usjevima – pšenica, uljana repica, kukuruz, suncokret, šećerna repa; Povrće na otvorenom polju – kupusnjače, luk, korjenasto povrće

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

## Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

---

ICL-ova rješenja za uzgoj