



Agroblen®

9-20-8+3MgO+0.1B

Jače ukorjenjivanje i ravnomjerniji rast

9 | 20 | 8 | 3.0
N P2O5 K2O MgO



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	9%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	2.7%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	6.3%
P2O5	Fosforov pentoksid	20%
	Topljiv u vodi (P2O5)	15.0%
K2O	Kalijev oksid	8%
	Topljiv u vodi (K2O)	8.0%
MgO	Magnezijev oksid	3.0%
B	Bor	0.10%
	Topljiv u vodi (B)	0.10%

Opis

Pomozite svojim šumskim nasadima i voćnjacima da se razgranaju uz Agroblen® 9-20-8+3MgO+0.1B | 8-9M. Ovo NPK gnojivo s visokim udjelom fosfora obogaćeno je borom i magnezijem, osiguravajući vašim biljkama ujednačen rast i jače ukorjenjivanje. Dizajniran posebno za primjenu u jamama za sadnju, ovaj je proizvod vaše savršeno rješenje za uspostavu šuma, poput crnogorice ili eukaliptusa, i usjeva u voćnjaku. Uživajte u kontroliranoj, kontinuiranoj i pouzdanoj ishrani zahvaljujući ICL-ovoj najsuvremenijoj tehnologiji otpuštanja, koja osigurava visokokvalitetne hranjive tvari tijekom zajamčenog razdoblja od 8-9 mjeseci, na prosječnoj temperaturi tla od 21C.

Prednosti

- Omjer NPK pogodan za šumske nasade i voćnjake
- Visok sadržaj fosfora idealan za podizanje novih nasada
- Može se primijeniti u jame za sadnju neposredno prije sadnje
- Ekološki prihvatljiv zbog minimiziranih gubitaka hranjivih tvari

Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti sadeći u jame.
- 2 Također možete primijeniti kod sadnje u nizu, lokalizirano ili kod sadnje rasipačima.
- 3 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 4 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 5 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 6 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 7 Smanjite primijenjenu dozu ako se vodotopiva gnojiva koriste u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 8 Čuvati na suhom
- 9 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 10 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



Stope primjene

Usjevi:	Stopa
Novi nasadi	
Šumarstvo: eukaliptus	50-75 g/biljci
Šumarstvo: jela	20-30 g/biljci
Voćnjaci	75-100 g/biljvi
Avokado	
Biljke uzgajane u posudama od 3 litre	50 g/biljci
Biljke uzgajane u posudama od 6 litara	100 g/biljci
Ostali prikladni usjevi	
Vinogradi i jagodičasto voće (kupine, maline, ribizl)	10-20 g/biljci

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj