



Agroleaf® Power

High N

Nahranite svoje usjeve hranjivim dušikom

31 | 11 | 11 | TE
N P2O5 K2O

Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	31%
	Nitratni dušik (N-NO3)	1.0%
	Urea dušik (N-urea)	30.0%
P2O5	Fosforov pentoksid	11%
	Topljiv u vodi (P2O5)	11.0%
K2O	Kalijev oksid	11%
	Topljiv u vodi (K2O)	11.0%
B	Bor	0.03%
	Topljiv u vodi (B)	0.03%
Cu	Bakar	0.070%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.070%
	Bakar EDTA (Cu)	0.070%
Fe	Željezo	0.14%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.14%
	Željezo DTPA (Fe)	0.14%
Mn	Mangan	0.07%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.07%
	Mangan EDTA (Mn)	0.07%
Mo	Molibden	0.001%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.070%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.070%
	Cink EDTA (Zn)	0.070%

Značajke

Opis

Agroleaf® Power High N vrhunska je folijarna prihrana topiva u vodi koja sprječava nedostatak dušika i drugih glavnih i sporednih elemenata. Posebno prikladan u stresnim ili lošim uvjetima uzgoja gdje je hvatanje korijena teško (na primjer hladni, vlažni vremenski uvjeti i visok pH tla), High N daje brze rezultate za zelenjenje i rast. Upotrebljavamo najčišće dostupne sirovine kako bismo dali Agroleaf® Poweru High N visoku čistoću zbog koje je potpuno topljiv u hladnoj vodi. To proizvodi brzu reakciju usjeva i uklanja svaki rizik od začepjenja raspršivača. High N također je kompatibilan s nizom sprejeva za zaštitu usjeva.

Prednosti

- \\ Isporučuje topljivi dušik s izvrsnom apsorpcijom
- \\ Savršen u teškim uvjetima uzgoja
- \\ Produljena dostupnost mikroelemenata

Kako upotrebljavati

- 1 Nanesite pod visokim pritiskom.
- 2 Može se miješati s mnogim fungicidima/insekticidima. Pitajte svog distributera za informacije.
- 3 Za sve mješavine s kemikalijama, napravite malu probu prije upotrebe u velikoj mjeri. Provjerite reakciju za 2 ili 3 dana.
- 4 Izbjegavajte prskanje u razdobljima nepovoljnih uvjeta (na primjer jaka sunčeva svjetlost, visoke podnevne temperature i razdoblja velikog isparavanja).
- 5 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Za vanjsku primjenu otopite 3 – 5 kg u 200 – 600 litara vode po hektaru. Za primjenu u stakleniku preporučujemo otopinu od 0,3 %.

Nanesite prvo u maloj mjeri prije promjene stope ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj