



Micromax®

TE Mix

Pobrinite se da vašim biljkama ne nedostaje Micromax®

0 | 0 | 0 | TE
N P2O5 K2O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	0%
P2O5	Fosforov pentoksid	0%
K2O	Kalijev oksid	0%
B	Bor	0.70%
	Topljiv u vodi (B)	0.70%
Cu	Bakar	0.500%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.500%
	Bakar EDTA (Cu)	0.500%
Fe	Željezo	7.80%
	Topljiv u vodi (Fe)	7.80%
	Željezo EDTA (Fe)	5.40%
	Željezo DTPA (Fe)	2.40%
Mn	Mangan	2.60%
	Topljiv u vodi (Mn)	2.60%
	Mangan EDTA (Mn)	2.60%
Mo	Molibden	0.320%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.320%
Zn	Cink	1.300%
	Topljiv u vodi (Zn)	1.300%
	Cink EDTA (Zn)	1.300%

Značajke

Opis

Ova mješavina elemenata u tragovima je vrhunski proizvod: sadrži sve glavne elemente kojih se možete sjetiti. Uvjeti ili loše vrijeme često mogu značiti gubitak hranjivih tvari, ali ne u ovom slučaju – svi kationski elementi dolaze u obliku kelata, što ih čini do 5 puta dostupnijima vašim biljkama. Pažljivo formulirana ravnoteža bitnih elemenata u tragovima branit će od nedostataka i potaknuti razvoj korijena i zdrav rast. Micromax® WS TE također sadrži X3, biostimulans koji poboljšava apsorpciju i unos hranjivih tvari. Osim toga, 100% je topiv u vodi, za brzu i jednostavnu pripremu.

Prednosti

- Uravnotežena formula esencijalnih elemenata u tragovima
- Jače korijenje za promicanje zdravog rasta
- Omogućuje brzu apsorpciju hranjivih tvari

Kako upotrebljavati

- 1 MicroMax® WS TE je vrhunski proizvod koji se lako i sigurno može koristiti u poljoprivredi i hortikulturi.
- 2 Iako je glavna metoda primjene fertirigacija, može se primijeniti i folijarnim prskanjem.
- 3 Čuvajte proizvod na hladnom, suhom i prozračenom mjestu.
- 4 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporučene vrijednosti

Cvijeće i povrće	Preventivno: primijeniti 1-2 kg/ha u ranoj fazi nakon uspostavljanja presadnica, u fazi 4-6 listova.
	Korektiv: Započnite s prvim simptomima nedostatka TE, primjenom 1-2 kg/ha i 2 dodatna prskanja u intervalima od 2-3 tjedna
Listopadno voće, drveće i grmlje	Preventivno: primijeniti 3-6 kg/ha u rano proljeće, čim drveće ima dovoljno lišća da upije prskani rastvor.
	Korektiv: započeti u zamatanju plodova s primjenom 3-6 kg/ha. Pripazite na simptome nedostatka TE i odmah reagirajte primjenom 2-3 dodatna prskanja u intervalima od 2-3 tjedna.

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj