



**Agrolution[®]
Special**

316

Posebna gnojiva za posebne usjeve

13 | 5 | 28 | 2.0 | 2.5 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Zajamčena analiza

oxide		
N	Ukupni dušik	13%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	11.0%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	0%
	Urea dušik (N-urea)	2.0%
	Organski dušik	0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	5%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	28%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	28.0%
CaO	Kalcijev oksid	2.0%
	Topljiv u vodi (CaO)	2.0%
MgO	Magnezijev oksid	2.5%
	Topljiv u vodi (MgO)	2.5%
B	Bor	0.01%
	Topljiv u vodi (B)	0.01%
Cu	Bakar	0.010%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.010%
	Bakar EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Željezo	0.16%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.16%
	Željezo EDTA (Fe)	0.16%
	Željezo DTPA (Fe)	0%
	Željezo EDDHA (Fe)	0%
Mn	Mangan	0.06%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.06%
	Mangan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molibden	0.006%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.006%
Zn	Cink	0.010%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.010%
	Cink EDTA (Zn)	0.010%

Opis

Za one trenutke kada vaše voće, povrće i ratarske kulture trebaju povećanje NPK s visokim sadržajem kalija i niskim udjelom fosfora, odaberite gnojivo za fertirigaciju Agrolution[®] Special 316. Ova primjena topljiva u vodi osmišljena je za povećanje dostupnosti i upijanja hranjivih tvari vaših biljaka. Uz njegovu visoku čistoću, topljivost i učinak zakiseljavanja, lako možete spriječiti naslage i začepjenja u svojim sustavima za navodnjavanje. Zaštitite svoje biljke od bolesti, poput truleži na kraju cvjetanja, zahvaljujući dodanom kalciju, koji također služi za produljenje ukupnog vijeka trajanja proizvoda.

Prednosti

- Proizvedeno od čistih sirovina
- Dolazi s paketom elemenata u tragovima
- Dodan magnezij za poboljšanu fotosintezu i energiju biljaka

Kako upotrebljavati

- 1 Asortiman Agrolution® nudi širok raspon sastava koji pokrivaju sve faze rasta usjeva, istovremeno pružajući prilagođenu pomoć određenim vrstama tla i vode.
- 2 Čuvati na suhom
- 3 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 4 Za posebne potrebe obratite se svom ICL savjetniku i zatražite informacije specifične za Agrolution® Special.

Stope primjene

Prosječna preporučena količina primjene je 40-50 kg/ha tjedno.

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj