



Solinure[®] GT

5

Pomaže vašim usjevima da odlično prebrode zimu

20 | 20 | 20 | TE
N P₂O₅ K₂O

5

Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	20%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	5.9%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	3.8%
	Urea dušik (N-urea)	10.3%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	20%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	20.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	20%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	20.0%
B	Bor	0.01%
	Topljiv u vodi (B)	0.01%
Cu	Bakar	0.002%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.002%
	Bakar EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Željezo	0.04%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.04%
	Željezo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Značajke

Opis

Za sveobuhvatno nutritivno rješenje ne tražite dalje od Solinure[®] GT 5 gnojiva za fertirigaciju. Sa svojom uravnoteženom NPK formulom, ovo uvijek pouzdano gnojivo je vaše idealno rješenje za pomoć vašim biljkama u staklenicima i tunelskim sustavima u njihovim zahtjevnim fazama rasta i sazrijevanja, dok je također savršeno prikladno za pomoć vašim usjevima kroz ta izazovna zimska proizvodna razdoblja. Uz što je moguće manje uree i potpuno bez klorida, vaše će biljke sigurno imati koristi od potpuno izmijenjenog paketa elemenata u tragovima i dodanog magnezija.

Prednosti

- Uravnotežena NPK formula
- Vrlo pouzdan
- Dizajniran za primjenu u fazi rasta i zrenja

Kako upotrebljavati

- 1 Koristite Solinure® GT 5 u svim fazama rasta i zrenja.
- 2 Čuvati na suhom.
- 3 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 4 Za konkretne savjete i preporuke obratite se ICL-u ili svojem stručnom savjetniku.

Stope primjene

Usjevi:	Stopa
Usjevi i povrće na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru:	40-60 kg/ha tjedno
Bobičasto voće, meko i koštičavo voće:	30-50 kg/ha tjedno

Preporučena količina: Nanesite 4-5 kg/1000 m² tjedno. Prvo isprobajte u maloj mjeri prije promjene količine ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj