



Solinure® FX

17

Osjetite snagu pouzdanog Solinure FX gnojiva

15 | 5 | 30
N P₂O₅ K₂O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	15%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	4.9%
	Urea dušik (N-urea)	10.1%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	5%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	30%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	30.0%

Značajke

Opis

Kada vaši usjevi voća i povrća na otvorenom ili u zaštićenom prostoru vape za pouzdanim unosom hranjivih tvari, jednostavno posegnite za gnojivom Solinure® FX 17. Iako je bogata ureom, ova NPK formula s visokim udjelom kalija ne sadrži kloride i ne sadrži dodane elemente u tragovima. Pružajući izvrsnu vrijednost za novac, ovaj zakiseljavajući Solinure proizvod ima dodatnu prednost jer osigurava da vaše cijevi za kapanje budu čiste nakon nanošenja.

Prednosti

- \\ Sadrži ureu, ali je bez klorida
- \\ Idealan za primjenu na otvorenom tlu
- \\ Bez dodanih elemenata u tragovima

Kako upotrebljavati

- 1 Koristite Solinure® FX 17 u fazama rasta i sazrijevanja voća.
- 2 Čuvajte na suhom.
- 3 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 4 Za konkretne savjete i preporuke obratite se ICL-u ili svojem stručnom savjetniku.

Stope primjene

Usjevi:	Stopa
Usjevi i povrće na otvorenim i zaštićenim prostorima:	40-60 kg/ha tjedno
Bobičasto voće, meko i koštičavo voće:	30-50 kg/ha tjedno

Prosječna preporučena količina: Nanesite 40-60 kg/10.000 m² tjedno. Prvo isprobajte u maloj mjeri prije promjene količine ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i kako je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj