



Solinure® FX

13

Osjetite učinak dvostrukog fosfora

16 | 32 | 16
N P₂O₅ K₂O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	16%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	4.3%
	Urea dušik (N-urea)	11.7%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	32%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	32.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	16%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	16.0%

Značajke

Opis

Za one usjeve voća i povrća uzgojene na otvorenom polju koji žude za dodatkom fosfora, ne tražite dalje od gnojiva za gnojidbu Solinure® FX 13. Sadržavajući dvostruku koncentraciju fosfora u odnosu na dušik i kalij, ova posebno prilagođena NPK formula savršena je za vaše primjene u tlu. Uz visokokvalitetnu ureu, ovaj proizvod također sadrži klorid, zajedno s nula dodanih elemenata u tragovima, osiguravajući vašim biljkama samo ono što im je posebno potrebno, što zauzvrat prenosi uštede na vas.

Prednosti

- \\ Održava sustave "kap po kap" čistima
- \\ Vrlo pouzdan proizvod
- \\ Bez dodanih elemenata u tragovima

Kako upotrebljavati

- 1 Koristite Solinure® FX 13 za faze rasta i sazrijevanja.
- 2 Čuvajte na suhom
- 3 Provjerite jeste li pravilno zatvorili djelomično iskorištene ili oštećene vreće.
- 4 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Usjevi

Stopa

Usjevi i povrće na otvorenim i zaštićenim prostorima:

40-60 kg/ha tjedno

Bobičasto voće, meko i koštichavo voće:

30-50 kg/ha tjedno

Prosječna preporučena količina: Nanesite 40-60 kg/10.000 m² tjedno. Prvo isprobajte u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i kako je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj