



# Solinure® FX

19

Osjetite efekt savršenog svježeg voća

10 | 10 | 40  
N P2O5 K2O



## Zajamčena analiza

| Oksid |                          |       |
|-------|--------------------------|-------|
| N     | Ukupni dušik             | 10%   |
|       | Amonijačni dušik (N-NH4) | 1.3%  |
|       | Urea dušik (N-urea)      | 8.7%  |
| P2O5  | Fosforov pentoksid       | 10%   |
|       | Topljiv u vodi (P2O5)    | 10.0% |
| K2O   | Kalijev oksid            | 40%   |
|       | Topljiv u vodi (K2O)     | 40.0% |

## Značajke

## Opis

Pomozite svojim voćnim usjevima da prođu kroz njihovu reproduktivnu fazu tretirajući ih savršenim hranjivim tvarima sa Solinure® FX 19 fertirigacijskim gnojivom. Ova NPK formula obogaćena kalijem savršena je za vaše primjene na otvorenom polju, u tlu. Uz njegovu visoku slanost, možete jamčiti poboljšanje kvalitete unutar vaših voćnih usjeva. Prepun visokokvalitetne uree i klorida, ovaj proizvod za zakiseljavanje ne sadrži elemente u tragovima, prilagođava se samo specifičnim potrebama vaših biljaka, a istovremeno čuva vaš novčanik.

## Prednosti

- \\ NPK formula s visokim udjelom kalija
- \\ Nevjerojatno pouzdan proizvod
- \\ Osigurava čiste vodove kapanja

## Kako upotrebljavati

- 1 Koristite Solinure® FX 19 za reproduktivni stadij biljaka.
- 2 Uz povećanu razinu soli, možete poboljšati kvalitetu svojih usjeva voća.
- 3 Čuvati na suhom.
- 4 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 5 Za konkretne savjete i preporuke obratite se ICL-u ili svojem stručnom savjetniku.

## Stope primjene

| Usjevi:                                               | Stopa              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Usjevi i povrće na otvorenim i zaštićenim prostorima: | 40-60 kg/ha tjedno |
| Bobičasto voće, meko i koštičavo voće:                | 30-50 kg/ha tjedno |

Prosječna preporučena količina: Nanesite 4-8 kg/1000 m<sup>2</sup> tjedno. Prvo isprobajte u maloj mjeri prije promjene količine ili neke druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

## Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj