



# Agroblen®

11-21-9+6MgO

Uberite plodove svog rada

11 · 21 · 9 · 6.0  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O MgO



## Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	11%
	Nitratni dušik (N-NO <sub>3</sub> )	3.0%
	Amonijačni dušik (N-NH <sub>4</sub> )	8.0%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Fosforov pentoksid	21%
	Topljiv u vodi (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	15.7%
K <sub>2</sub> O	Kalijev oksid	9%
	Topljiv u vodi (K <sub>2</sub> O)	9.0%
MgO	Magnezijev oksid	6.0%

## Opis

Počastite svoje usjeve u šumarstvu, vinogradu i voćnjaku dobro zaokruženom primjenom fosfora s Agroblen® 11-21-9+6MgO | 8-9M. Ovo NPK gnojivo s visokim udjelom fosfora obogaćeno je dodanim kalcijem, magnezijem, sumporom i borom kako bi vaše biljke dobile sveobuhvatan paket hranjivih tvari koji potiče svestrani rast. Gledajte kako vaše biljke napreduju tijekom unaprijed definiranog razdoblja od 8-9 mjeseci, zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnih sirovina s ICL-ovom patentiranim Resin Release tehnologijom.

## Prednosti

- Omjer NPK dizajniran za uspostavljanje dugoročnih usjeva
- Visok sadržaj fosfora za nove nasade
- Ekološki prihvatljiv zbog minimiziranih gubitaka hranjivih tvari
- Može se primjeniti u jame za sadnju neposredno prije sadnje
- Visoka razina magnezija za maksimiziranje fotosinteze

## Kako upotrebljavati

..

- 1 Primijeniti metodom jame za sadnju.
- 2 Također možete primjeniti kod sadnje u nizu, lokalizirano ili kod sadnje rasipačima.
- 3 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 4 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 5 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 6 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 7 Smanjite primjenjenu dozu ako se vodotopiva gnojiva koriste u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 8 Čuvati na suhom
- 9 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 10 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



## Stope primjene

### Usjevi:

### Stopa

Voćnjaci (novi nasadi):	75-100 g/biljci
Vinogradi i jagodičasto voće (kupina, malina, ribizl) (novi nasadi):	10-20 g/biljci

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

### Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj

