



Agroblen®

14-12-9+0.1B

Ubrzava ukorjenjivanje i rast

14 | 12 | 9
N P₂O₅ K₂O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	14%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	6.1%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	7.9%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	12%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	9.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	9%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	9.0%
B	Bor	0.10%

Opis

Oplemenite svoj novi voćnjak ili šumske nasade s Agroblen® 14-12-9+0.1B | 8-9M. Ovo potpuno obloženo NPK gnojivo sadrži visoke razine dušika i fosfora, savršeno za ubrzavanje rasta i optimizaciju ukorjenjivanja vaših usjeva. U kombinaciji s nižom razinom kalija, zajedno s dodanim borom, vaše će biljke sigurno imati koristi od ovog kompletnog paketa hranjivih tvari. Osigurajte održivi rast zahvaljujući ICL-ovoj patentiranoj tehnologiji otpuštanja smole, koja osigurava kontrolirano otpuštanje hranjivih tvari tijekom zajamčenog razdoblja od 8-9 mjeseci, pri temperaturi tla od 21 C.

Prednosti

- \\ Kontrolirano i dosljedno oslobađanje hranjivih tvari za ravnomjeran rast usjeva
- \\ Može se primijeniti u jame za sadnju neposredno prije sadnje
- \\ Omjer NPK dizajniran za uspostavljanje dugoročnih usjeva
- \\ Ekološki prihvatljiv zbog minimiziranih gubitaka hranjivih tvari

Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti metodom jame za sadnju.
- 2 Također možete primijeniti kod sadnje u nizu, lokalizirano ili kod sadnje rasipačima.
- 3 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 4 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 5 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 6 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 7 Smanjite primijenjenu dozu ako se vodotopiva gnojiva koriste u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 8 Čuvati na suhom
- 9 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 10 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



Stope primjene

Usjevi:	Stopa
Šumarstvo – eukaliptus (novi nasadi):	50 g/biljci
Šumarstvo – četinari (novi nasadi):	20-30 g/biljci
Voćnjaci (novi nasadi):	75-100 g/biljci
Kava (novi nasadi):	50-100 g/biljci
Ostale pogodne kulture: Vinogradi i jagodičasto voće (kupina, malina, ribizl)– novi nasadi	10-20 g/biljci

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj