



Agroblen®

17-9-8+4MgO

Oživite svoje usjeve pod umjerenom ili suptropskom klimom

17 | 9 | 8 | 4.0
N P2O5 K2O MgO



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	17%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	7.5%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	9.5%
P2O5	Fosforov pentoksid	9%
	Topljiv u vodi (P2O5)	6.7%
K2O	Kalijev oksid	8%
	Topljiv u vodi (K2O)	8.0%
MgO	Magnezijev oksid	4.0%

Opis

Kada dođe proljeće, pobrinite se da se vaši umjereni i suptropski usjevi probude s Agroblen® 17-9-8+4MgO 8-9M. Ovo granulirano NPK gnojivo s visokim udjelom dušika posebno je formulirano kako bi vam pomoglo u uspostavljanju novih plantaža umjerenih i suptropskih područja, poput avokada i citrusa. S dodatkom magnezija za poboljšanu fotosintezu, ovaj je proizvod idealan za proljetne primjene. Zahvaljujući ICL-ovoj patentiranoj tehnologiji oslobađanja, vaše biljke mogu uživati u kontroliranom, kontinuiranom i pouzdanom oslobađanju hranjivih tvari 8-9 mjeseci.

Prednosti

- Visoka razina dušika potiče vegetativni rast
- Može se primijeniti u jame za sadnju neposredno prije sadnje
- "Ujednačen rast usjeva zahvaljujući postojanom i kontinuiranom oslobađanju hranjivih tvari "
- Dodatni magnezij za poboljšanu fotosintezu

Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti metodom jame za sadnju.
- 2 Također možete primijeniti kod sadnje u nizu, lokalizirano ili kod sadnje rasipačima.
- 3 Ne primjenjivati duže od 1-2 tjedna prije sadnje.
- 4 Usaditi u tlo na dubinu između 5-10 cm.
- 5 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 6 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 7 Smanjite primijenjenu dozu ako se vodotopiva gnojiva koriste u drugom dijelu ciklusa usjeva.
- 8 Čuvati na suhom. Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.

Stope primjene

Usjevi:	Stopa
Voćnjaci (novi nasadi):	75-100 g/biljci
Avokado: biljke koje se uzgajaju u posudama od 3 litre. Način primjene: zatrpavanje (pomiješano sa zemljom oko korijena):	50 g/biljci
Avokado: biljke koje se uzgajaju u posudama od 6 litara. Način primjene: zatrpavanje (pomiješano sa zemljom oko korijena):	100 g/biljci
Citrusi (novi nasadi, s mladim biljkama iz vreća od 4-6 litara):	150-200 g/biljci
Kava (novi nasadi):	50-100 g/biljci
Ostale pogodne kulture: Vinogradi i jagodičasto voće (kupina, malina, ribizl) (novi nasadi):	10-20 g/biljci

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj