



Agroleaf[®] Liquid

Zinc M+

Jedno rješenje za nedostatak cinka i mangana



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	0%
K ₂ O	Kalijev oksid	0%
Mn	Mangan	2.30%
	Topljiv u vodi (Mn)	2.30%
	Mangan EDTA (Mn)	2.30%
Zn	Cink	3.700%
	Topljiv u vodi (Zn)	3.700%
	Cink EDTA (Zn)	3.700%

Značajke

Opis

Uz Agroleaf[®] Liquid Zinc M+, dva nedostatka hranjivih tvari se ispravljaju jednim proizvodom. Sadrži mikronutrijente cinka i mangana u obliku kelata. Možete ga primijeniti folijarnim prskanjem ili fertirigacijom na ratarske i drvenaste kulture. Cink M+ je pogodan za prevenciju ili liječenje nedostatka cinka ili mangana, jer sadrži više cinka od svog sestrinskog proizvoda Agroleaf[®] Liquid Man Z+. Koristiti kao folijarno prskanje ratarskih kultura kao preventivnu mjeru. Cink M+ najbolje je primijeniti u razdoblju najvećeg vegetativnog rasta. Na voćkama se preporučuje tijekom početka i razvoja većih izbijanja, izbjegavajući puno cvatnje. Kada se primjenjuje fertirigacijom, Cink M+ preporučuje se za preventivnu primjenu.

Prednosti

- \\ Dva u jednom: ispravlja i sprečava nedostatak cinka i mangana
- \\ Sadrži više cinka nego Agroleaf[®] Liquid Man Z+
- \\ Pogodan za ratarske i voćne kulture

Kako upotrebljavati

- 1 Na ratarskim kulturama izvršiti 2-3 preventivna tretmana u razdoblju najvećeg vegetativnog rasta, a na drvenastim kulturama s početkom i razvojem većeg nicanja, izbjegavajući razdoblja pune cvatnje. Razrijedite u količini od 200-400 cc/Hl bez prekoračenja 8 L/Ha po primjeni. Primijeniti maksimalnu dozu ako se uoče nedostaci.
- 2 Folijarno prskanje citrusa: Posebno za usjeve citrusa, primijenite početnu dozu u proljeće kada se pojave novi izdanci, kada dovoljno razvijeni novi listovi budu 2/3 svoje prirodne veličine. Primijeniti ponovno unutar 15 dana, a zatim ponovno tijekom ljetne cvatnje. Za primjene s ukupnom potrošnjom manjom od 2000 L/Ha, koristite veće doze (350 cc/Hl); veće količine (do maksimalno 3000 L/Ha), koristiti polovicu doze (250 cc/Hl).
- 3 Koštičavo voće i voće sa sjemenkama: Primijeniti u razdoblju najvećeg vegetativnog rasta, kada usjev ima dovoljnu lisnu masu. Preporučena doza je 200-250 cc/Hl uz maksimalno korištenje 1000 L/Ha.
- 4 Povrće: Preporučena doza je 150-200 cc/Hl uz maksimalno korištenje između 800 i 1000 L/Ha.

Stope primjene

Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj