



**Agroleaf[®]
Liquid**

Man Z+

Nedostaci mangana i cinka otklonjeni primjenom jednog gnojiva



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	0%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	0%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	0%
	Urea dušik (N-urea)	0%
	Organski dušik	0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	0%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	0%
K ₂ O	Kaljev oksid	0%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	0%
Mn	Mangan	4.70%
	Topljiv u vodi (Mn)	4.70%
	Mangan EDTA (Mn)	4.70%
Zn	Cink	1.300%
	Topljiv u vodi (Zn)	1.300%
	Cink EDTA (Zn)	1.300%

Značajke

Opis

Dva nedostatka hranjivih tvari ispravljena jednim rješenjem: Agroleaf[®] Liquid Man Z+. Sadrži mikronutrijente mangana i cinka u obliku kelata, razvijen za primjenu folijarnim prskanjem i/ili fertirigacijom, kako za ratarske tako i za voćnjake. Man Z+ se može koristiti za prevenciju ili liječenje nedostatka mangana i cinka, s više mangana nego njegov sestrinski proizvod Agroleaf[®] Liquid Zinc M+. Koristiti kao folijarno prskanje ratarskih kultura kao preventivnu mjeru. Man Z+ najbolje je primijeniti u razdoblju najvećeg vegetativnog rasta. Na voćkama se preporučuje tijekom početka i razvoja većih izbijanja, izbjegavajući puno cvatnje. Kada se primjenjuje fertirigacijom, Man Z+ se preporučuje za preventivnu primjenu.

Prednosti

- \\ Dva u jednom: ispravlja i sprečava nedostatak mangana i cinka
- \\ Sadrži više mangana od Agroleaf[®] Liquid Zinc M+
- \\ Pogodan za ratarske i voćarske kulture

Kako upotrebljavati

- 1 Upute: Na ratarskim kulturama izvršite 2-3 preventivna tretmana u razdoblju najvećeg vegetativnog rasta, a na drvenastim kulturama s početkom i razvojem većeg nicanja, izbjegavajući razdoblja pune cvatnje.
- 2 Razrijedite u količini od 200-350 cc/Hl bez prekoračenja 8 L/Ha po primjeni. Primijenite maksimalnu dozu ako se uoče nedostaci.
- 3 Koristite sredstvo za vlaženje.
- 4 Folijarno prskanje citrusa: Posebno za usjeve citrusa, primijenite početnu dozu u proljeće kada se pojave novi izdanci, kada dovoljno razvijeni novi listovi budu 2/3 svoje prirodne veličine. Primijenite ponovno unutar 15 dana, a zatim ponovno tijekom ljetne cvatnje.
- 5 Za primjene s ukupnom potrošnjom manjom od 2000 L/Ha, koristite veće doze (350 cc/Hl). Za veće količine (do maksimalno 3000 L/Ha), koristite polovicu doze (250 cc/Hl).
- 6 Folijarno prskanje koštičavog voća i voća sa sjemenkama: Primijenite u razdobljima najvećeg vegetativnog rasta, kada usjev ima dovoljnu lisnu masu. Preporučena doza je 150-250 cc/Hl uz maksimalno korištenje 1000 L/Ha.
- 7 Povrće: Preporučena doza je 150-200 cc/Hl uz maksimalno korištenje između 800 i 1000 L/Ha.
- 8 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj

