



**Agroleaf[®]
Liquid**

B-10

Dodatak bora za vrhunsku kvalitetu usjeva

0 | 0 | 0
N P2O5 K2O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	0%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	0%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	0%
	Urea dušik (N-urea)	0%
	Organski dušik	0%
P2O5	Fosforov pentoksid	0%
	Topljiv u vodi (P2O5)	0%
K2O	Kalijev oksid	0%
	Topljiv u vodi (K2O)	0%
B	Bor	10.00%
	Topljiv u vodi (B)	10.00%

Značajke

Opis

Agroleaf[®] Liquid B-10 je tekuće gnojivo s 10% bora. Ono sprečava ili ispravlja nedostatke ili neravnoteže u asimilaciji ovog mikronutrijenta. Možete birati između folijarne ili radikularne primjene, za drvenaste i zeljaste usjeve. Nedostatak bora najrašireniji je nedostatak mikronutrijenata diljem svijeta, koji uzrokuje velike gubitke u proizvodnji i kvaliteti usjeva. Bez dovoljno bora, biljke ne dobivaju vegetativni i reproduktivni rast koji im je potreban, sprečava se širenje stanica, ubija meristem i smanjuje plodnost. Ali to nije slučaj kada koristite Agroleaf[®] Liquid B-10 i dajete vašim usjevima obilje bora.

Prednosti

- \\ Sprečava nedostatak bora
- \\ Pogodan za drvenaste i zeljaste kulture
- \\ Folijarna ili radikularna primjena

Kako upotrebljavati

- 1 Za kulture posebno osjetljive na nedostatak bora, preporuča se preventivna radikularna i/ili folijarna primjena, tako da podijelite navedenu dozu u 2 ili 3 obroka.
- 2 Kod drvenastih kultura savjetujemo da preventivne tretmane provedete nakon cvatnje i zametanja plodova, a kod ratarskih kultura tijekom početnih faza jačeg vegetativnog rasta.
- 3 U slučaju nedostatka, izvršite 2 ili 3 uzastopne folijarne primjene B-10 u razmacima od 15-20 dana, te po potrebi nastavite s primjenom doza na korijenje.
- 4 Čuvati na suhom.
- 5 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 6 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Usjevi:	Metoda:
---------	---------

Masline:	Primijeniti 30 dana prije cvatnje i u fazi stvrđnjavanja koštica u dozi od 150-350 cc/hl, uz ukupnu potrošnju 800-1.000 l/ha.
Citrusi i voće:	Primijeniti prije cvatnje, opadanja latica i razvoja plodova u dozi od 150-300 cc/hl.
Povrće:	Primijeniti 150-300 cc/hl 15 dana prije početka cvatnje.

Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj