



Agroleaf[®] Liquid

High P

 Magas foszfortartalom az erős és bőtermő növényekért

5

N

25

P₂O₅

5

K₂O

TE

Leírás

Az Agroleaf[®] Liquid High P egy kiváló minőségű folyékony NPK lombtrágya kifejezetten magas, 25%-os foszfor-pentoxid-tartalommal a foszforhiány megelőzése érdekében. Kelatizált mikroelemek teljes skáláját tartalmazza. Az Agroleaf[®] Liquid High P tartalmazza az ICL által kifejlesztett egyedülálló F3 SurfActive technológiát, amely a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát. Az F3 csökkenti a permetecseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranedvesedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	5%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	5%



P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	25%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	25%
K ₂ O	Kálium-oxid	5%
	Vízoldékony (K ₂ O)	5%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.06%
	Vízoldékony (Fe)	0.06%
	Vas-EDDHA (Fe)	0.06%
Mn	Mangán	0.03%
	Vízoldékony (Mn)	0.03%
	Mangán EDTA (Mn)	0.03%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Előnyök

- ▶ Kiemelkedően magas foszfortartalommal a foszforhiány megelőzése és/vagy megszüntetése céljából
- ▶ Kelatizált mikroelemekkel kiegészített
- ▶ Jobb permetteritődés, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok



Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlésszükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általánosan	3-6	300-600	1	1 héttel az ültetés után, virágzás előtt és után 2-3 alkalommal
Szamóca, levélzöldségek, káposztafélék, karfiol, brokkoli	3-6	300-600	1	Ültetés után 1-2 alkalommal
Vöröshagyma, fokhagyma	3-6	300-600	1	2-3 leveles állapotban 1-2 alkalommal
Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	3-6	600-1000	0.5-0.6	Virágzás előtt és betakarítás előtt 2 héttel 1-2 alkalommal
Burgonya	3-6	250-300	1.2-2	Gumóképzés időszakában 1-2 alkalommal
Kukorica	3-6	200-300	1.5-2	4-6 leveles állapotban 1-2 alkalommal
Olajrepcé	3-6	200-300	1.5-2	Ősszel vagy kora tavasszal
Dísznövények	2-3	600-1000	0.3	1 héttel az ültetés vagy kelés után és virágzás előtt 1-2 alkalommal

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

1

Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-p-2/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

