



Agroleaf® Liquid

Magnesium

Folyékony tápanyag a magnéziumigényes növények számára

7 | 0 | 0 | 10
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	7%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	0%
MgO	Magnézium-oxid	10%
	Vízoldékony (MgO)	10.0%

Leírás

Az Agroleaf® Liquid Magnesium egy kiváló minőségű folyékony lombtrágya, amely bármely kultúrnövény esetén alkalmazható a magnézium pótlására. Az Agroleaf® Liquid Magnesium tartalmazza az ICL által kifejlesztett egyedülálló F3 SurfActive technológiát, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetcseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranevedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Előnyök

- \\ Tökéletes a magnéziumhiány megszüntetésére és megelőzésére
- \\ Sokféle kultúrnövény esetében alkalmazható
- \\ Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Használati útmutató

1 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlésszükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általánosan	3-6	300-600	1	A teljes termesztési ciklus alatt, 4-5 alkalommal
Burgonya	3-6	250-300	1.2-2	Virágzás után, 2-3 alkalommal
Vöröshagyma, fokhagyma	3-6	300-600	1	5-6 leveles állapottól, 2- 3 alkalommal
Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	3-6	600-1000	0.5-0.6	Terméskötéstől betakarításig, 3-4 alkalommal
Gabonafélék	3-6	200-300	1.5-2	2 nóduszos állapottól zászlóslevél állapotig
Kukorica	3-6	200-300	1.5-2	8-10 leveles állapotban
Olajrepcse	3-6	200-300	1.5-2	Tavasszal a virágzásig

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.