



Agroleaf® Liquid

Moly B

 Az Ön prémium minőségű folyékony műtrágyája bórral és molibdénnel

4

N

16

P₂O₅

4

K₂O

TE

Leírás

Az Agroleaf® Liquid Moly B egy kiváló minőségű folyékony NPK lombtrágya, bórral és magas molibdéntartalommal. A magas bór- és molibdénigényű kultúrák számára fejlesztettük ki, gyors megoldást kínálva az ezen tápanyagok esetleges hiányának korrigálására. Az Agroleaf® Liquid Moly B hatékonyságát az ICL által kifejlesztett F3 SurfActive technológia garantálja, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetcseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranevedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	4%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	2.6%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	1.4%



P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	16%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	16%
K ₂ O	Kálium-oxid	4%
	Vízoldékony (K ₂ O)	4%
B	Bór	0.1%
	Vízoldékony (B)	0.1%
Mo	Molibdén	2%
	Vízoldékony (Mo)	2%

Előnyök

- \\ Megszünteti és megelőzi a virágképződéskor jelentkező bór- és molibdénhiányt
- \\ Sokféle kultúrnövény esetében alkalmazható
- \\ Jobb permetteríthetőség, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok

Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlésszükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általánosan és burgonya	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	A teljes termesztési ciklus során, szabadföldön termesztett növények esetén, sorzáródás után
Hüvelyesek (szója)	1-2	300	0.3-0.7	6 leveles állapotban
Káposzta, karfiol, brokkoli	1-3	300-600	0.3-0.5	6-8 leveles állapottól, 2-3 alkalommal



Olajrepce	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Ősszel, tavasszal virágzásig 2 alkalommal
Napraforgó	1-3	200-300	0.5-1	4-6 leveles állapotban
Cukorrépa	1-3	250-400	0.4-0.8	6-8 leveles állapotban
Legelő	0.5-1	200-300	0.25-0.3	A teljes termesztési időszak során 2-3 alkalommal

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

1

Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-moly-b/>
: 15/05/2024