



Agroleaf[®] Liquid

Iron

 JaVASlatunk a vashiány megelőzésére

0 | 0 | 0 | TE
N P₂O₅ K₂O

Leírás

Az Agroleaf[®] Liquid Iron egy prémium minőségű folyékony lombtrágya a vashiány megelőzésére és kezelésére. Mindenféle növénykultúrához, de különösen bogyós gyümölcsökhöz való felhasználásra lett kifejlesztve. Az Agroleaf[®] Liquid Iron tartalmazza az ICL által kifejlesztett egyedülálló F3 SurfActive technológiát, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetecseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranedvesedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%

K ₂ O	Kálium-oxid	0%
Fe	Vas	4.4%
	Vízoldékony (Fe)	4.4%
	Vas EDTA (Fe)	4.4%



Előnyök

- Elégítse ki növényei vasszükségletét
- Növények széles körében alkalmazható, különösen a bogyós gyümölcsöknél
- Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok

Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlésszükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általában	3-6	300-600	1	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal
Szamóca	3-6	250-400	1.2-1.5	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal
Áfonya	3-6	250-400	1.2-1.5	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal
Egyéb bogyós gyümölcsök	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal, hiánykezelő kijuttatásként
Gyümölcsösök	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal, gyógyító kezelésként

Szőlőültetvények	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal, gyógyító kezelésként
Dísznövények	2-3	600-1000	0.3	A teljes termesztési ciklusban 3- 4 alkalommal



Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

1

Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-iron-2/>
: 12/05/2024