



Greenmaster® Liquid

High K

Kímélje meg a gyepet a stressztől!

3 | 3 | 10 | TE
N P2O5 K2O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	2.4%
P2O5	Foszfor-pentoxid	3%
	Vízoldékony (P2O5)	3.0%
K2O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K2O)	10.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.004%
	Vízoldékony (Cu)	0.004%
	Réz EDTA (Cu)	0.004%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.001%
	Vízoldékony (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.004%
	Vízoldékony (Zn)	0.004%
	Cink EDTA (Zn)	0.004%

Leírás

A Greenmaster® Liquid High K termékkel felkészítheti a gyepet a stresszidőszakokra és segítheti a regenerálódását. Alacsony nitrogén- és foszfortartalma lassú és egyenletes növekedést biztosít és segíti a jó gyökeresedést. A magas káliumtartalom a talajban lévő vas felszabadításával javítja a gyep egészségét és színét. Teljes mikroelemtartalma mindent megad a gyepnek, amire szüksége van a szezon okozta stresszből való regenerálódáshoz. Hatása 6 héten át tart.

Előnyök

- \\ Ideális a stresszidőszakok előtti megelőző alkalmazáshoz
- \\ Lassú növekedés és jó gyökeresedés
- \\ Teljes mikroelemtartalom a stressz utáni regenerálódáshoz

Használati útmutató

- 1 Alkalmazza júniustól novemberig.
- 2 A lombon keresztül történő felvétel optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékleten és napsütéses időben történő kijuttatást.
- 3 Kerülje a fagyos körülmények vagy szárazság idején történő kijuttatást.
- 4 A Greenmaster® Liquid termékek alkalmasak a termékcsaládon belüli más termékekkel való egytartályos keverésre (a Ca-Booster kivételével).
- 5 Egy tartályban keverhető a H2Pro és H2Pro Maximize talajnedvesítő szerekkel. TurfMark® Extra szóráskepzelővel keverhető a permetezés követésére, a víz kondicionálására és a permetlé-elsodródásminimalizálására.
- 6 A Greenmaster® Liquid termékek kijuttatásához használt vízmennyiség befolyásolja a növények tápanyagfelvételének módját.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

40-120 l/ha

Javasolt átlagos dózis:

80 l/ha

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.