



Sportsmaster[®] WSF

Spring & Summer

Tavaszi tápanyagbomba a gyönyörű gyepért

28 | 5 | 19 | TE

N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	28%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	5.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	21.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	19%
	Vízoldékony (K ₂ O)	19.0%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.016%
	Vízoldékony (Cu)	0.016%
	Réz EDTA (Cu)	0.016%
Fe	Vas	0.13%
	Vízoldékony (Fe)	0.13%
	Vas-DTPA (Fe)	0.13%
Mn	Mangán	0.06%
	Vízoldékony (Mn)	0.06%
	Mangán EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.016%
	Vízoldékony (Zn)	0.016%
	Cink EDTA (Zn)	0.016%

Leírás

Ez a vízzoldható gyepműtrágya felturbózza a gyepet: a különleges TMax-technológiánk felélénkíti a lombzat színét és serkenti a gyökereket, hogy azok hatékonyabban vegyék fel a talajból a tápanyagokat. Magasnitrogéntartalmának köszönhetően gyors látványi hatás érhető el. Magas káliumtartalma egyenletes növekedést és szövetszilárdságot biztosít. A különböző forrásokból származó nitrogén (beleértve a magas karbamidnitrogént is) lehetővé teszi, hogy a gyep számára a lehető leghosszabb ideig rendelkezésre álljon. Mikroelemeket is tartalmaz az egészségesebb gyep érdekében. Tökéletes kiegészítője az Ön granulátumos alpműtrágyázási programjának. Más összetevőkkel tankkeverékbe is keverhető, ha több nitrogénre van szükség. Márciustól augusztusig használható.

Előnyök

- Magas nitrogéntartalom a gyors hatás és a jobb hasznosulás érdekében
- Egészségesebb, erősebb, egyenletesebben fejlődő gyep
- Tankkeverékben kiegészítő nitrogénpótláshoz ideális

Használati útmutató

- 1 A Sportsmaster® WSF termékek egy tartályban keverhetők a termékcsalád más termékeivel és a H2Pro®, H2Pro® Maximize nedvesítőszerrel.
- 2 Kerülje a használatát fagyos vagy aszályos időben. Ügyeljen az egyenletes szórásképre és az els..
- 3 Annak érdekében, hogy a termék teljesen feloldódjon, a szükséges mennyiséget egy félig töltött permetlétartályba adagolja, majd keverje 10-15 percig. Ezután tölts fel a tartályt a teljes mennyiségű vízzel. A víz hőmérséklete hatással van az oldódás sebességére.
- 4 Lombtrágyázáshoz alacsony lémenységet használjon (300–600 l/ha), és a felszívódás optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékletet és a napsütéses időjárást.
- 5 Ha gyökéren keresztüli felszívódáshoz juttatja ki, használjon nagy lémenységet (600–1000 l/ha), és közvetlenül utána legalább 2-3 percig öntözzön, hogy biztosítsa a talajba jutáshoz szükséges vízmennyiséget, és csökkentse a perzselés kockázatát.
- 6 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz, ezért ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 7 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 15–60 kg/ha

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli. c

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.