



Greenmaster® Liquid

High N

A nitrogénnel feltöltött stresszoldó

25 | 0 | 0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	25%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	5.9%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	12.0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.004%
	Vízoldékony (Cu)	0.004%
	Réz EDTA (Cu)	0.004%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.001%
	Vízoldékony (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.004%
	Vízoldékony (Zn)	0.004%
	Cink EDTA (Zn)	0.004%

Leírás

A Greenmaster® Liquid High N tankkeverék-adalék magas nitrogéntartalma gyors kezdeti növekedést biztosít a gyepeknek. A több forrásból származó nitrogén biztosítja a növény maximális tápanyagfelvételét. A teljes mikroelemtartalom gondoskodik a gyepek egészségéről és segíti a stressz utáni regenerálódást. Bónuszként pedig a hozzáadott magnézium nagyszerű színt kölcsönöz a gyepterületnek.

Előnyök

- \\ Magas nitrogéntartalom a gyors kezdeti gyeppureakcióért, akár 6 hétig is tartó hatással
- \\ Vegyes nitrogénforrás a növény optimális tápanyagfelvétele érdekében
- \\ Javítja a gyepek egészségét és a stressz utáni regenerálódást

Használati útmutató

- 1 Alkalmazza márciustól júliusig.
- 2 A lombon át történő felvétel optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékleten és napsütéses időben történő kijuttatást. Kerülje a fagyos körülmények vagy szárazság esetén történő kijuttatást.
- 3 A Greenmaster® Liquid termékek alkalmasak a termékcsaládon belüli más termékekkel való egytartályos keverésre (a Ca-Booster kivételével).
- 4 Egy artályban keverhető a H2Pro és H2Pro Maximize talajnedvesítő szerekkel. TurfMark® Extra szóráskepzelővel keverhető a permetezés követésére, a víz kondicionálására és a permetlé-elsodródás minimalizálására.
- 5 A Greenmaster® Liquid termékek kijuttatásához használt vízmennyiség befolyásolja a növények tápanyagfelvételének módját.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

40-120 l/ha

Javasolt átlagos dózis:

80 l/ha

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.