



ProTurf®

12-5-20+2CaO+2MgO

Az igazi nehézsúlyú gypért

12	5	20	2.0	2.0
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	12%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	10.7%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Kálium-oxid	20%
	Vízoldékony (K ₂ O)	20.0%
CaO	Kalcium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (CaO)	2.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%

Leírás

Ha szeretné gyorsan és hatékonyan megerősíteni az igénybevett gypet, akkor ProTurf® 12-5-20+2CaO+2MgO a legjobb választás. Hagyományos granulált műtrágya és a szabályozott feltáródású, burkolt szemcsék egyedülálló kombinációja.. Magas magnézium-, kálium-, kén- és kalciumtartalmú, polihalitban gazdag apró szemcséi erős gypet eredményeznek., Több hónapig hozzáférhető, burkolt nitrogént tartalmaz. Szélsőséges időjárási körülmények között, a legforróbb nyári vagy a leghidegebb téli időszakokban is erős, egészséges gypet eredményez.

Előnyök

- \\ Könnyen, egyneletesen kijuttatható foltosodás veszélye nélkül
- \\ Jól kézben tartható gypnövekedés és gyors zöldítő hatás
- \\ Jól oldódó, átlátszó és szagtalan, így minimális mértékben zavarja a gyp használatát

Használati útmutató

- 1 A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segíti a gyors felvehetőséget, és fokozza az azonnali hatást.
- 3 Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 4 A lábnyomok elfedése érdekében kijuttatás után öntözze be a területet.
- 5 A granulátumok roncsolódásának megelőzése érdekében a műtrágyát a gyepszellőztetést követően kell kijuttatni.
- 6 Száraz helyen tárolja.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően ragassza le
- 8 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20,00–35,00 g/m² Javasolt átlagos dózis: 27,5 g/m² A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.