



Hi-Mag

Adjon a gyepeknek egy kis pluszt a növekedéshez!



Leírás

Egyetlen egyszerű alkalmazással a gyepek 6 héten át megkapnak minden szükséges mikroelemet. A superkoncentrált mini szemcsék biztosítják a tápanyagok gyors eloszlását, amivel segítik a gyepek egészséges növekedését. A gyepek kondicionálására is használható egy esetleges stresszhatás előtt. Emellett megelőzhetők a jövőbeli hiánybetegségek is. A STEP® Hi-Mag magas magnéziumtartalmának köszönhetően a gyepek élénkebb, egészségesebb és teltebb színű lesz. Ideális olyan helyeken, ahol a gyökézőna tápanyagmegtartó képessége alacsony, például magas homoktartalmú talajon. Rugalmasan beilleszthető a meglévő műtrágyázási programokba is.

Előnyök

- \\ Az összes alapvető mikroelem mellett magas magnéziumtartalma is segíti az egészséges, ragyogó színű gyepfelület kialakulását
- \\ Könnyen szétosztható, finom szemcsék
- \\ Hasznos homokos területeken

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületre juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet.
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket. A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait. Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben
- 3 Kerülje a fagyos vagy száraz körülmények esetén történő kijuttatást. A járdára, betonra, textíliára stb. kifolyt anyagot azonnal söpörje le, mivel a termék elszíneződést okozhat.
- 4 Vasat tartalmaz, ezért ne használja, ha fennáll a betonnal, márvánnyal, kővel, szövettel, úszómedencével való érintkezés veszélye.
- 5 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gyepszellőztetés után javasolt. Műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gyepszellőztetést.
- 6 A kezelés hathetente megismételhető.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási arányok

Javasolt dózis: 7,00-11,00 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.