



# Agromaster®

30-7-13

Kiemelkedő terméshozam egyetlen kijuttatással

30 | 7 | 13  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O



## Garantált összetétel

| Oxid                          |                                              |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| N                             | Összes nitrogén                              | 30%   |
|                               | Ammóniás nitrogén (N-NH <sub>4</sub> )       | 2.6%  |
|                               | Karbamid-nitrogén (N-Urea)                   | 27.4% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Foszfor-pentoxid                             | 7%    |
|                               | Vízoldékony (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 6%    |
| K <sub>2</sub> O              | Kálium-oxid                                  | 13%   |
|                               | Vízoldékony (K <sub>2</sub> O)               | 13%   |

## Leírás

Az Agromaster® 30-7-13 | 4-5M ideális rizs, illetve egyéb (szub)trópusi növények termesztéséhez. 70%-ban tartalmaz burkolt nitrogént, aminek köszönhetően a teljes tenyésztésidőszakra elegendő egyetlen kijuttatás. Innovatív E-Max Release technológiánknak köszönhetően a körülményektől függetlenül mindig kézben tarthatja a növények számára hozzáférhető tápanyagok mennyiségét. Növényei fejlődése intenzív, ugyanakkor szabályozott. A környezetbarát burkolatú granulátumnak köszönhetően kevesebb nitrogén mosódik ki a talajból – az Agromaster® egyszerűen mindent megtesz a növényeiért.

## Előnyök

- \\ Magas nitrogéntartalom a növekedés serkentéséhez
- \\ Magasabb vagy hasonló hozam egyetlen alkalmazással a rizs teljes termesztési ciklusa során
- \\ Jobb nitrogénfelhasználási hatékonyság a hagyományos műtrágyákhoz képest

## Használati útmutató

- 1 Vetés/ültetés előtt szórással juttassa ki.
- 2 Az Agromaster®-t 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Tárolja száraz körülmények között.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 5 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

## Alkalmazási javaslatok

| Kultúrák                                            | Javasolt dózis |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Rizs                                                | 400-600 kg/ha  |
| Egyéb, (szub)trópusi régiókban termesztett növények | 400-800 kg/ha  |

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

## Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.