



Agromaster®

15-7-15+3MgO+34SO₃

Kiegyensúlyozott összetétel sokféle növényhez

15 | 7 | 15 | 3.0 | 34.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	7.0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	7%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	15%
	Vízoldékony (K ₂ O)	15.0%
MgO	Magnézium-oxid	3.0%
	Vízoldékony (MgO)	3.0%
SO ₃	Kén-trioxid	34.0%
	Vízoldékony (SO ₃)	34.0%

Leírás

Az Agromaster® 15-7-15+3MgO+34SO₃ | A 2-3M megbirkózik a kedvezőtlen termesztési helyzetekkel. Szabályozott feltárodású burkolt tápanyagok és gondosan kiválasztott hagyományos műtrágyaszemcsék keverékét tartalmazza. Ez a típus 2-1-2 NPK-aránnyal rendelkezik. Kiegyensúlyozott arányban tartalmaz nitrogént és káliumot az egyenletes növekedés érdekében. Mmellett magnéziumot biztosít a fotoszintézis fokozására, valamint nagy adagú ként a fejlődés elősegítésére és a nitrogénfelvétel fokozására. Nitrogéntartalma 30%-ban burkolt, így a tápanyagok akár 3 hónapon át folyamatosan rendelkezésre állnak, amikor a növényeknek a legnagyobb szükségük van rájuk. Ez a hatékony műtrágya megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, mivel az egyedülálló E-Max Release technológiának köszönhetően kevesebb nitrogén vesz el kimosódás, elpárolgás vagy denitrifikáció révén. Könnyen kijuttatható, tökéletes formula a nagyobb termés hozam érdekében olyan növényeknél, mint a levélzöltségek, például a spenót vagy a rukkola. Termő korú gyümölcs- és szőlőültetvényekben is alkalmazható.

Előnyök

- \\ Nitrogén és kálium, valamint magnézium és kén kiegyensúlyozott összetételben
- \\ Magasabb termés hozam a tartós tápanyagellátásnak és a minimális nitrogénvesztésnek köszönhetően.
- \\ Azonnal felvehető és szabályozott feltárodású tápanyagok kombinációja

Használati útmutató

- 1 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 2 Az Agromaster®-t 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízőldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Termő korú ültetvények	
Szőlő- és gyümölcsültetvények	400-800 kg/ha
Levéleződségek	
Spenót és rukkola	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.