



Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO₃

Elégedett növények, időjárástól függetlenül

19 | 5 | 20 | 4.0 | 19.5
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	19%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.4%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	17.6%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Kálium-oxid	20%
	Vízoldékony (K ₂ O)	20.0%
MgO	Magnézium-oxid	4.0%
SO ₃	Kén-trioxid	19.5%

Leírás

Az Agromaster® 19-5-20+4MgO+19,5SO₃ | 2-3M melkedően sok nitrogént és káliumot tartalmaz a zöldségek és gyümölcsök egyenletes fejlődése érdekében. Ideális szabadföldön vagy növényházban termesztett növények termesztése esetén, illetve szabadföldi faiskolákban. Magnéziumot tartalmaz a fotoszintézis fokozására, valamint ként a hatékonyabb nitrogénfelvétel érdekében. A hagyományos nitrogén mellett 35%-ban tartalmaz burkolt nitrogént, amely a legkorszerűbb E-Max feltáródási technológiákkal rendelkezik, így a 2-3 hónapos hatástartam alatt a nitrogén fokozatosan szabadul fel, ezáltal a növények terméshozama nő ugyanolyan kijuttatási mennyiség mellett. Kevesebb a pazarlás: a nitrogén kimosódása, elpárolgása és denitrifikációja minimálisra csökken, így több jut a növényeknek.

Előnyök

- \\ Magas N- és K-tartalom az egyenletes növekedésért, magnéziummal és kénnel kiegészítve
- \\ Hozamnövekedést eredményez. A szokásos terméshozam fenntartása érdekében alacsonyabb dózisban használja.
- \\ Azonnal felvehető és szabályozott feltáródású tápanyagok optimális keveréke

Használati útmutató

- 1 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 2 Az Agromaster®-t 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízdoldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Szabadföldi faiskolák	400-800 kg/ha
Növényházi és szabadföldi gyümölcsök és zöldségek	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.