



Sportsmaster® WSF

High K

Ellenállóbb gyept TMax technológiával

15 | 0 | 43
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	12.7%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	2.3%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	43%
	Vízoldékony (K ₂ O)	43.0%

Jellemzők

Leírás

Ez a prémium vízzoldható gyepműtrágya ideális arra, hogy felkészítsük a gyepet a stresszhatásokra, például a téli hidegre vagy a nyári aszályra. A szabadalmaztatott TMax technológia biztosítja a tápanyagok kiváló felszívódását a lombzaton és a gyökérzeten keresztül. Kombinálható a granulátumos alapműtrágyázási programmal, májustól decemberig alkalmazható. Az alacsony nitrogén- és magas káliumtartalmának köszönhetően megerősíti a gyepet miközben biztosítja, hogy az ne növekedjen túl gyorsan. A kelatizált vas fokozza a lombszínt, míg a benne lévő karbamidnitrogén-forrás javítja a leveleken keresztüli tápanyagfelvételt.

Előnyök

- Prémium minőségű vízzoldható gyepműtrágya a stresszállapotok megelőzésére
- A lombon keresztül is kiválóan felvehető, ellenállóbb, élénk zöld színű gyepet eredményez.
- Jól kombinálható granulátumos alapműtrágyázási programmal

Használati útmutató

- 1 A Sportsmaster® WSF termékek egy tartályban keverhetők a termékcsalád más termékeivel és a H2Pro®, H2Pro® Maximize nedvesítőszerekkel.
- 2 Kerülje a használatát fagyos vagy aszályos időben.
- 3 Ügyeljen az egyenletes kijuttatásra és az esetleges elsodródásra.
- 4 Annak érdekében, hogy a termék teljesen feloldódjon, a szükséges mennyiséget egy félig töltött permetlétartályba adagolja, majd keverje 10-15 percig.
- 5 Ezután töltsse fel a tartályt a teljes mennyiségű vízzel. A víz hőmérséklete hatással van az oldódás sebességére.
- 6 A Sportsmaster® WSF kijuttatásához felhasznált vízmennyiség hatással van arra, hogy a növény hogyan veszi fel a tápanyagokat.
- 7 Lombtrágyázáshoz alacsony lémenyiséget használjon (300–600 l/ha), és a felszívódás optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékletet és a napsütéses időjárást.
- 8 Ha gyökéren keresztüli felszívódáshoz juttatja ki, használjon nagy lémenyiséget (600–1000 l/ha), és közvetlenül utána legalább 2-3 percig öntözzön, hogy biztosítsa a talajba jutáshoz szükséges vízmennyiséget, és csökkentse a perzselés kockázatát.
- 9 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz: ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 10 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.



Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 15–60 kg/ha

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.