



Start

Az új telepítésű gyepek tökéletes tápanyaga

19 | 19 | 5 | 2.0
N P2O5 K2O MgO

2-3

Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	19%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.4%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	12.9%
P2O5	Foszfor-pentoxid	19%
	Vízoldékony (P2O5)	14.2%
K2O	Kálium-oxid	5%
	Vízoldékony (K2O)	5.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%

Leírás

Válassza Sportsmaster CRF Mini Start termékünket, ha felülvetést végez vagy új gyeget telepít: minden létfontosságú tápanyagot tartalmaz, ami a gyeplendület kezdeti fejlődéséhez szükséges. A műtrágyák gyakran perzselik a frissen telepített gyeget, a Sportsmaster® CRF Mini Start tápanyagtartalma lassan tárolódik fel, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és segítsük a gyeplendület folyamatos és egyenletes növekedését. Minden tápanyagot tartalmaz, amire csak a frissen telepített gyeplendületnek szüksége van: nitrogén a gyeplendület kezdeti gyors fejlődéséhez és sűrűsödéséhez, foszfor a gyökerek megerősödéséhez, valamint a mikroelemek teljes választéka a minden szempontból egészséges gyeplendület érdekében. A Sportsmaster® CRF Mini Start a szabadalmaztatott Poly-S bevonatos technológiánkat alkalmazza, amely 2-3 hónapig biztosítja a tápanyagok feltáródását, a burkolat nélküli szemcsék pedig elősegítik, hogy a gyeplendület azonnal is hozzájusson tápanyagokhoz.

Előnyök

- \\ Kifejezetten felülvetéshez vagy új gyeplendület telepítéséhez kifejlesztve
- \\ A fű gyorsan megered, majd egyenletesen és egészségesen növekszik
- \\ Szabályozott feltáródás a perzselés elkerülése érdekében

Használati útmutató

- 1 Száraz levélzetre juttassa ki.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segíti a granulátumok elosztatását, gyorsabb kezdeti hatást eredményez és elfedi a taposás nyomait.
- 3 A granulátumok roncsolódásának megelőzése érdekében javasoljuk, hogy gypszellőztetés után juttassa ki.
- 4 Ne alkalmazza fagyos vagy aszályos időben.
- 5 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz: ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 6 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20–25 g/ha

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.